

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ:  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

## Индометацин Софарма 10% мазь Indometacin Sopharma 10% ointment

индометацин (indometacin)

Прочтите внимательно весь листок-вкладыш, так как он содержит важную для Вас информацию.

Этот лекарственный препарат отпускается без рецепта врача. Несмотря на это, для получения наилучших результатов лечения, Вам следует осторожно соблюдать инструкции к применению лекарственного препарата.

- Сохраните этот листок-вкладыш. У Вас может появиться необходимость прочитать его снова.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, обратитесь к Вашему фармацевту.
- Вам следует обратиться за помощью к врачу, если Ваши симптомы ухудшаются или не наблюдается их улучшение спустя 10 дней.
- Если любое побочное действие становится серьезным или Вы заметите другие, не описанные в этом листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

### В этом листке-вкладыше:

1. Что представляет собой Индометацин Софарма мазь и для чего используется
2. Перед тем, как использовать Индометацин Софарма мазь
3. Как применять Индометацин Софарма мазь
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Индометацин Софарма мазь
6. Дополнительная информация

### 1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА МАЗЬ И ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Индометацин Софарма мазь содержит активное вещество индометацин, которое принадлежит к группе лекарственных средств, названных противоревматическими или нестероидными противовоспалительными. Индометацин облегчает симптомы воспаления - боль и отек. Индометацин Софарма мазь предназначен для местного симптоматического лечения боли и отека при воспалительных и дегенеративных заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата (сухожилия, мышцы, суставы); при локализованных формах внесуставного ревматизма опорно-двигательного аппарата: тендиниты, синовиты, тендовагинит, воспаление фасций и суставных связок, бурсит; при некоторых формах артрита суставов верхних и нижних конечностей или позвоночника.

### 2. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА МАЗЬ

Не применяйте Индометацин Софарма мазь

- если у Вас аллергия (гиперчувствительность) к активному веществу или любой из остальных составных частей препарата;
- если у Вас гиперчувствительность к аспирину или другим нестероидным противовоспалительным средствам с клиническим проявлением астматического приступа, крапивницы или аллергического ринита.

Соблюдайте особую осторожность при применении Индометацин Софарма мазь

- если у Вас язва желудка или двенадцатиперстной кишки, сердечно-сосудистая недостаточность, заболевания печени, почек;
- если у Вас были проявления гиперчувствительности к пищевым продуктам и лекарственным препаратам;
- если Вы страдали астмой или у Вас другие аллергические заболевания;
- если у Вас гиперчувствительность к аспирину или другим противоревматическим лекарственным средствам;
- мазь наносится только на здоровую кожу (в отсутствии открытых ран и повреждений);
- не наносится в глаза и на слизистые оболочки;
- в случае кожных или других признаков гиперчувствительности применение лекарственного препарата следует прекратить;
- если лечение длится более 10 дней, рекомендуется провести лабораторный контроль лейкоцитов и тромбоцитов.

### Прием других лекарственных средств

Просим проинформировать Вашего врача или фармацевта, если Вы принимаете или недавно использовали другие лекарственные препараты, включительно и отпускаемые без рецепта.

Несмотря на то, что взаимодействия с другими лекарственными средствами мало вероятны при местном применении, уведомите Вашего врача, если принимаете аспирин или другие противовоспалительные лекарственные препараты, кортикостероиды, лекарственные препараты для понижения кровяного давления.

### Беременность и грудное вскармливание

Обратитесь за советом к Вашему врачу или фармацевту перед использованием любого лекарственного препарата. Использование Индометацин Софарма мазь не рекомендуется во время беременности и в период грудного вскармливания.

### Управление транспортными средствами и работа с машинами

Индометацин Софарма мазь является лекарственной формой для местного применения и не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с машинами.

### Важная информация о некоторых из составных частей Индометацин Софарма мазь

Индометацин Софарма мазь содержит в качестве вспомогательного вещества диметилсульфоксид, который может оказать на кожу раздражающее действие.

В составе препарата содержится ланолин, который может оказать раздражающее действие на кожу (контактный дерматит).

### 3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА МАЗЬ

Всегда применяйте Индометацин Софарма мазь, в точности соблюдая указания в этом листке-вкладыше. Если Вы в чем-то не уверены, спросите Вашего врача или фармацевта.

Применяется местно, на кожу.

Взрослые и подростки с 15 лет: мазь наносят на пораженный участок 3-4 раза в день, осторожно втирая в кожу до ее полной резорбции. Количество мази, необходимое для одного нанесения, зависит от площади поражения и составляет около 4-5 см. Мазь применяют не менее чем через 6-часовой интервал.

Дети до 15 лет: Применение препарата у этой возрастной группы не рекомендуется.

Продолжительность лечения: 7-10 дней. Если за этот период времени нет влияния на симптомы, лечение следует пересмотреть.

**Если Вы применили дозу Индометацин Софарма мазь, превышающую необходимую**

Так как препарат применяется местно, передозировка мало вероятна. При инцидентном приеме больших количеств препарата или при попадании в глаза, на слизистые оболочки или открытые раны, обратитесь за советом к Вашему лечащему врачу или за помощью в ближайшее лечебное учреждение.

**Если Вы пропустили нанесение Индометацин Софарма мазь**

Если Вы пропустили нанести одну дозу и наступило время для следующей дозы, нанесите ее как обычно. Не используйте двойное количество лекарственного препарата при следующем применении.

Если у Вас есть дополнительные вопросы, связанные с применением этого препарата, просим спросить Вашего врача или фармацевта.

### 4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как все лекарственные средства, Индометацин Софарма мазь может вызвать побочные действия, несмотря на то, что они проявляются не у каждого.

При местном применении чаще всего сообщается о местных реакциях со стороны кожи после применения препарата - жжение в месте применения, покраснение, зуд, высыпания, шелушение и сухота кожи.

Редко можно наблюдать отек и образование пузырьков на коже в месте применения, аллергические реакции, такие как хрипение, удушье и отечность лица.

При появлении описанных побочных действий со стороны кожи, применение препарата следует прекратить.

При применении на больших поверхностях кожи могут появиться такие побочные действия, как нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, боль, кровоизлияния и изъязвления).

Если любое из побочных действий становится серьезным или Вы заметите другие, не описанные в этом листке-вкладыше побочные действия, просим уведомить об этом Вашего врача или фармацевта.

### 5. КАК ХРАНИТЬ ИНДОМЕТАЦИН СОФАРМА МАЗЬ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Срок годности после вскрытия тубы - до 1 месяца.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте Индометацин Софарма мазь после срока годности, отмеченного на картонной упаковке. Срок годности соответствует последнему дню указанного месяца.

Лекарственные средства не следует выбрасывать в канализацию или в контейнер для бытовых отходов. Поинтересуйтесь у Вашего фармацевта, как утилизировать ненужные Вам лекарственные средства. Эти меры будут способствовать охране окружающей среды.

### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Что содержится в Индометацин Софарма мазь**

Активное вещество - индометацин (indometacin) 100 мг в 1 г мази.

Прочие составные части: ланолин, белый мягкий парафин, диметилсульфоксид, желтый пчелиный воск; кремния диоксид, коллоидальный безводный; лавандовое масло.

**Как выглядит Индометацин Софарма мазь и что содержится в упаковке**

Желтая гомогенная мазь со специфическим запахом.

40 г мази в алюминиевых тубах с мембраной, с колпачками из полипропилена, по 1 тубе в картонной пачке, вместе с листком-вкладышем.

**Условия отпуска:** без рецепта.

**Владелец разрешения к употреблению и производитель**

АО СОФАРМА

1220 София, ул. Илиенское шоссе 16, Болгария

**Дата последнего пресмотра листка-вкладыша:** декабрь, 2012.

**Reg. №12995**