

Кардилопин®

таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг

(амлодипин)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

(информация для пациентов)

Кардилопин®

таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг

(амлодипин)

Внимательно и полностью прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата, так как она содержит важную для Вас информацию

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство назначено Вам лично. Не передавайте его другим людям. Оно может нанести им вред, даже если у них имеются те же симптомы заболевания.
- Если у Вас возникнет какой-либо побочный эффект или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:

1. Что такое препарат Кардилопин® таблетки и для чего его применяют
2. Что следует знать до начала приема препарата Кардилопин® таблетки
3. Как следует принимать препарат Кардилопин® таблетки
4. Возможное побочное действие
5. Как следует хранить препарат Кардилопин® таблетки
6. Срок годности
7. Условия отпуска из аптек
8. Содержимое упаковки и другая информация

1. Что такое препарат Кардилопин® таблетки и для чего его применяют

Действующее вещество препарата

Кардилопин® – амлодипин – является блокатором кальциевых каналов.

Кардилопин® применяется для лечения следующих состояний:

- Высокого артериального давления (артериальной гипертензии)
- Определенной формы боли в груди – стенокардии, а также ее редкой формы – вариантной стенокардии (стенокардия Принцметала)

Если у Вас повышено артериальное давление, то данный препарат расширит кровеносные сосуды, облегчая прохождение крови через них. У пациентов со стенокардией Кардилопин® улучшает кровоснабжение сердечной мышцы, вследствие чего, она получает больше кислорода, предупреждая развитие загрудинной боли. Ваше лекарственное средство не вызывает немедленного облегчения при загрудинной боли, вызванной стенокардией.

2. Что следует знать до начала приема препарата Кардилопин® таблетки

Не принимайте таблетки Кардилопин®

- если у Вас аллергия на амлодипин, другие антагонисты кальциевых каналов и/или на любые другие вспомогательные вещества, приведенные в разделе 8. При этом может развиваться зуд, покраснение кожи или затрудненное дыхание
- если у Вас резко понижено артериальное давление (гипотензия)
- если у Вас клинически значимое сужение аортального клапана сердца (стеноз аорты) или кардиогенный шок (состояние, при котором сердце не способно снабжать ткани достаточным количеством крови)
- если у Вас развилась сердечная недостаточность после инфаркта миокарда

Меры предосторожности при медицинском применении

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом перед началом применения препарата Кардилопин®.

Сообщите Вашему лечащему врачу, если у Вас имеются или имелись следующие состояния:

- Недавно перенесенный инфаркт миокарда
- Сердечная недостаточность
- Резкое повышение артериального давления (гипертонический криз)
- Заболевания печени
- Если Вы пожилой человек и Вам необходимо повысить дозу

Дети и подростки в возрасте до 18 лет

Данное лекарственное средство не следует применять у детей младше 6 лет. Для лечения гипертонии таблетки Кардилопин® можно назначать только детям и подросткам от 6 до 17 лет. Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.

Другие лекарственные средства и препарат Кардилопин® таблетки

Сообщите Вашему лечащему врачу или фармацевту о любых лекарственных средствах, которые Вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать.

Кардилопин® может повлиять на эффект других лекарственных средств, а другие препараты могут повлиять на эффект таблеток Кардилопин®. К ним относятся следующие лекарственные средства:

- кетоконазол, итраконазол (противогрибковые препараты)
- ритонавир, индинавир, нелфинавир (так называемые ингибиторы протеазы, применяемые для лечения ВИЧ)
- эритромицин, кларитромицин (антибиотики)
- верапамил, дилтиазем (препараты для лечения сердечных заболеваний)
- дантролен (инфузии для лечения тяжелых изменений температуры тела)

Кардилопин® может вызвать более выраженное уменьшение артериального давления, если Вы одновременно принимаете и другие препараты для лечения высокого артериального давления.

Применение препарата Кардилопин® с пищей и напитками

Пациенты, принимающие Кардилопин®, не должны потреблять грейпфрут или пить сок грейпфрута. Это связано с тем, что грейпфрут и его сок могут повысить уровень активного вещества (амлодипина) в плазме крови, что может привести к непредсказуемому усилению эффекта таблеток Кардилопин® понижать артериальное давление.

Фертильность, беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете иметь ребёнка, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту до начала применения этого препарата.

Беременность

Безопасность применения амлодипина при беременности не исследовалась.

Грудное вскармливание

Неизвестно, выделяется ли амлодипин в грудное молоко.

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед приемом любого лекарственного средства, если Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работы с механизмами

Кардилопин® может повлиять на Вашу способность управления транспортными средствами и работы с механизмами. Если во время приема таблеток Вы ощущаете тошноту, головокружение, усталость или головную боль, воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами и немедленно сообщите об этом Вашему лечащему врачу.

3. Как следует принимать препарат Кардилопин® таблетки

Этот препарат следует принимать строго в соответствии с назначением врача. Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.

Режим дозирования

Рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг один раз в день. С учетом реакции больного начальная доза может быть увеличена до 10 мг один раз в день.

Больным пожилого возраста, а также при нарушении функции почек препарат назначают в обычных дозах.

Дети и подростки в возрасте до 18 лет

Для детей и подростков в возрасте 6–17 лет рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг/сутки. Максимально рекомендуемая доза – 5 мг/сутки. Очень важно не прекращать прием таблеток. Обращайтесь к Вашему лечащему врачу, не дожидаясь, пока Ваши таблетки закончатся.

Способ применения

Таблетки для приема внутрь. Таблетки Кардилопин® рекомендуется принимать в одно и то же время дня. Вы можете принимать это лекарственное средство перед или после еды, запивая водой. Не принимайте Кардилопин® с соком грейпфрута.