

ЛАМОЛЕП® таблетки

LAMOLEP®

МНН: ламотриджин (lamotrigine)

online-apteka.am

Перед началом применения данного препарата внимательно прочитайте эту инструкцию от начала до конца, поскольку она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраните эту инструкцию. Возможно, Вам понадобится прочитать её снова.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, задайте их Вашему врачу или фармацевту.
- Этот лекарственный препарат назначен только Вам. Не передавайте его другим лицам. Это может нанести им вред, даже если симптомы их заболевания аналогичны Вашим.
- Если у Вас возникли какие-либо побочные реакции, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту. Это относится к любым побочным реакциям, не перечисленным в данной инструкции.

Содержание инструкции по применению:

1. Что представляет из себя Ламолеп, и для чего он применяется.
2. Что Вам необходимо знать перед применением препарата Ламолеп.
3. Как принимать Ламолеп.
4. Возможные побочные реакции.
5. Как хранить Ламолеп.
6. Условия отпуска.
7. Дополнительная информация.

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЛАМОЛЕП, И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ

Ламолеп относится к группе препаратов, называемых противоэпилептическими. Он используется для лечения эпилепсии и биполярного расстройства.

Ламолеп оказывает действие при эпилепсии путем блокирования в головном мозге сигналов, запускающих эпилептические приступы.

У взрослых и детей в возрасте 13 лет и старше Ламолеп может применяться как самостоятельно, так и совместно с другими препаратами для лечения эпилепсии. Ламолеп может также применяться с другими препаратами для лечения приступов, возникающих при синдроме Леннокса-Гасто.

У детей в возрасте от 2 до 12 лет Ламолеп может применяться с другими препаратами для лечения этих же заболеваний. Ламолеп может применяться самостоятельно для лечения эпилептических приступов, именуемых типичными абсансами.

Ламолеп применяется также для лечения биполярного расстройства.

Люди с биполярным расстройством (иногда называемым маниакальной депрессией) страдают от резких перепадов настроения, когда периоды мании (возбуждение или эйфория) чередуются с периодами депрессии (глубокой печали или отчаяния). У лиц в возрасте 18 лет и старше Ламолеп может применяться как самостоятельно, так и с другими препаратами для предупреждения периодов депрессии, возникающей при биполярном расстройстве. До сих пор неизвестно, каким образом Ламолеп реализует этот эффект в головном мозге.

2. ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ЛАМОЛЕП**Не применяйте Ламолеп:**

– Если у Вас имеется аллергия на ламотриджин или любое из вспомогательных веществ этого лекарственного средства (перечисленные в разделе 7).

Предупреждения и меры предосторожности

Применяйте Ламолеп с осторожностью:

- если у Вас имеются заболевания почек;
- если у Вас когда-либо появлялась сыпь после приема ламотриджина или других препаратов для лечения эпилепсии или биполярного расстройства;
- если у Вас когда-либо развивался менингит после приема ламотриджина (прочитайте описание этих симптомов в разделе 4 данной инструкции: **Другие побочные реакции**);
- если Вы уже принимаете препарат, содержащий ламотриджин.

Если любой из перечисленных пунктов относится к Вам (даже если Вы в этом не уверены), пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу, который решит, необходимо ли Вам снизить дозу или подходит ли Ламолеп для Вас.

Следите за возникновением важных симптомов

Если у Вас появился любой из перечисленных симптомов после начала приема Ламолепа, немедленно обратитесь к врачу:

- Потенциально опасная для жизни кожная сыпь в виде красноватых мишенеподобных пятен или крапивных пятен на туловище, часто с пузырями в центре (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, которые регистрировались при использовании ламотриджина).
- Дополнительные симптомы для поиска включают изъязвления в полости рта, горле, слизистой носа, половых органов и конъюнктивит (покрасневшие и опухшие глаза).
- Эти потенциально опасные для жизни кожные проявления часто сопровождаются гриппоподобными симптомами.
- Кожная сыпь может прогрессировать до распространенных пузырей или отслаивания эпидермиса.

Наибольший риск возникновения серьезных кожных реакций наблюдается в первые недели лечения. Если у Вас уже развивался синдром Стивенса-Джонсона или токсический эпидермальный некролиз при использовании ламотриджина, Вам нельзя снова начинать прием Ламолепа.

Если у Вас появилась сыпь или описанные кожные симптомы, прекратите прием Ламолепа, получите срочную консультацию врача, сообщив ему о том, что Вы принимаете данное лекарство.

Другие важные симптомы:

- беспричинные кровотечения или появление кровоподтеков (синяков), посинение пальцев;
- боль в горле, повышение частоты инфекций (например простуды).

Вероятность появления этих симптомов больше в первые недели лечения Ламолепом, особенно если Вы начали прием с больших доз или дозировка увеличивается слишком быстро, а также если Вы одновременно принимаете лекарственные препараты, именуемые вальпроатами. У детей названные побочные эффекты встречаются чаще, чем у взрослых.

Перечисленные симптомы без соответствующего лечения могут перерасти в более серьезные проблемы, такие как органичная недостаточность или тяжелые поражения кожи. Если Вы заметили любой из этих симптомов, как можно скорее обратитесь к врачу. Ваш врач может назначить исследование печени, почек, крови и может сказать Вам прекратить прием Ламолепа.

Мысли о нанесении себе вреда или о суициде

У лиц с биполярным расстройством могут иногда возникать мысли о нанесении себе вреда или о совершении самоубийства. Если у Вас имеется биполярное расстройство, то подобные мысли могут возникать:

- в начале лечения;
- если у Вас уже были мысли о причинении себе вреда или самоубийстве;
- если Вам менее 25 лет.

В редких случаях у людей, страдающих эпилепсией, также могут возникать мысли о причинении себе вреда или самоубийстве. В малом количестве случаев у

пациентов, получающих Ламолеп по поводу биполярного расстройства или эпилепсии, появлялись такие мысли.

Если у Вас есть беспокойство или негативный опыт, или если Вы стали чувствовать себя хуже, или появились новые симптомы во время приема Ламолепа, обратитесь за помощью к Вашему врачу или в ближайшую больницу как можно скорее.

Если Вы принимаете Ламолеп для лечения эпилепсии

Приступы при некоторых типах эпилепсии могут в редких случаях ухудшаться или учащаться во время приема Ламолепа. У некоторых пациентов могут развиваться тяжелые эпилептические приступы, представляющие серьезную угрозу здоровью. Если во время приема Ламолепа Ваши приступы стали учащаться или стали более тяжелыми, как можно скорее обратитесь к врачу.

Дети и подростки

Ламолеп не предназначен для лечения биполярного расстройства у пациентов младше 18 лет.

Лекарственные средства для лечения депрессии и других психических расстройств могут увеличить риск суицидальных мыслей и суицидального поведения у детей и подростков младше 18 лет.

Приём других препаратов

Проинформируйте своего врача, если Вы принимаете, принимали ранее или можете принимать другие препараты.

Проинформируйте врача, если Вы принимаете один из следующих препаратов. Возможно, Вашему доктору придется откорректировать дозу Ламолепа:

- окскарбазепин, фелбамат, габапентин, леветирacetам, прегабалин, топирамат или зонизамид, используемые для лечения эпилепсии;
- препараты лития, применяемые для лечения психических проблем;
- бупропион, применяемый для лечения психических проблем или для прекращения курения.

Некоторые препараты взаимодействуют с Ламолепом и могут повысить вероятность побочных эффектов. Сообщите Вашему доктору, если Вы принимаете какой-либо из этих препаратов:

- вальпроаты, применяемые для лечения эпилепсии и психических проблем;
- карbamазепин, применяемый для лечения эпилепсии и психических проблем;
- фенитоин, примидон, фенобарбитал, применяемые для лечения эпилепсии;
- оланзапин, применяемый для лечения психических проблем;
- рисперидон, применяемый для лечения психических проблем;
- рифампицин, являющийся антибиотиком;
- комбинацию лопинавира и ритонавира, или атазанавири и ритонавири, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции;
- гормональные контрацептивы;

Сообщите Вашему врачу, что Вы принимаете, собираетесь принимать или прекратили прием:

Гормональные контрацептивы (контрацептивные таблетки) могут влиять на эффективность Ламолепа.

Ваш врач может порекомендовать Вам использовать оральные гормональные контрацептивы или другой метод контрацепции, например, презерватив, колпачок или внутриматочную спираль. Если Вы используете противозачаточные таблетки, доктор может назначить исследование крови для определения уровня Ламолепа. Если Вы планируете начать использование гормональных контрацептивов, сообщите это Вашему врачу для того, чтобы обсудить наиболее подходящий для Вас метод контрацепции.

Ламолеп также может изменить действие гормональных контрацептивов, хотя маловероятно, что он снизит их эффективность. Если Вы используете гормональные контрацептивы и Вы заметили какие-либо отклонения в менструальном цикле, например, прерывные кровотечения или кровянистые выделения между менструациями, сообщите Вашему врачу. Это может быть признаком того, что Ламолеп оказывает влияние на действие гормональных контрацептивов.

Беременность и кормление грудью

Если Вы беременны, или не исключаете, что можете быть беременны, а также планируете беременность или кормите грудью, проконсультируйтесь у Вашего доктора или фармацевта перед началом приема этого препарата.

Вам не следует прекращать лечение эпилепсии во время беременности. Однако, существует повышенный риск врожденных дефектов у детей, чьи матери принимали Ламолеп во время беременности. Эти дефекты включали в себя заячью губу или незаращение неба. Ваш доктор может посоветовать Вам дополнительный прием фолиевой кислоты, если Вы планируете беременность и во время беременности.

Беременность также может изменить эффективность Ламолепа, поэтому может потребоваться проведение анализа крови для определения уровня Ламолепа и коррекции дозы.

Сообщите Вашему врачу, если Вы кормите или планируете кормить грудью. Активное вещество Ламолепа проникает в грудное молоко и может оказать действие на ребенка. Ваш доктор должен обсудить с Вами риск и преимущества грудного кормления во время приема Ламолепа и будет периодически наблюдать за ребенком, если Вы решите кормить грудью.

Управление автотранспортом и работой с механизмами

Ламолеп может вызвать головокружение и двоение предметов перед глазами. Не управляйте автомобилем и не работайте с механизмами если Вы не уверены в отсутствии такого действия препарата. Если у Вас эпилепсия, сообщите Вашему врачу о том, управляете ли Вы автомобилем или работаете ли Вы с механизмами.

Ламолеп содержит лактозу

Если у Вас имеется непереносимость некоторых сахаров (лактозы или других сахаров), сообщите об этом врачу до приема Ламолепа.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ЛАМОЛЕП

Когда принимайте этот препарат в точности так, как рекомендовал Вам врач. В случае сомнений уточните у врача или фармацевта.