

(кломифен)

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
(информация для пациентов)

Внимательно и полностью прочтите эту инструкцию перед началом приема данного лекарственного препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраните этот листок. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство предназначено для Вас лично и Вы не должны передавать его другим лицам. Оно может нанести им вред, даже если у них имеются те же симптомы заболевания.
- Если у Вас возникнет какой-либо побочный эффект или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:

1. Что такое препарат Клостилбегит® таблетки и для чего его применяют
2. Что следует знать до начала приема препарата Клостилбегит® таблетки
3. Как следует принимать препарат Клостилбегит® таблетки
4. Возможные побочные эффекты
5. Как следует хранить препарат Клостилбегит® таблетки
6. Срок годности
7. Условия отпуска из аптек
8. Содержимое упаковки и другая информация

1. Что такое препарат

Клостилбегит® таблетки и для чего его применяют

Активное вещество препарата Клостилбегит® – кломифена цитрат – является синтетическим препаратом, который стимулирует овуляцию, то есть выход яйцеклеток из яичника. Препарат применяется для стимуляции созревания яйцеклеток при некоторых заболеваниях, при которых нарушается процесс овуляции.

2. Что следует знать до начала приема препарата Клостилбегит® таблетки

Перед началом приема препарата Клостилбегит® обсудите с Вашим лечащим врачом следующие факторы риска:

- Лечение этим препаратом может вызвать многоплодную беременность
- Повышенный риск внематочной (эктопической) беременности
- Повышенный риск развития опухоли яичника

При беременности возможно развитие врожденных дефектов плода или потеря беременности, которые, однако, могут иметь место и без применения препарата Клостилбегит®.

Не принимайте таблетки

Клостилбегит® и сообщите Вашему лечащему врачу в следующих случаях:

- Если у Вас аллергия к действующему или любому из вспомогательных веществ, приведенных в разделе 8 (признаками аллергической реакции являются кожная сыпь, затруднение глотания или дыхания, отек губ, лица, горла или языка);
- Если Вы беременны. С целью исключения беременности до начала лечения таблетками Клостилбегит® следует сделать тест на беременность;
- Если Вы страдаете заболеванием печени или нарушением ее функции;
- Если у Вас киста яичника;
- Если у Вас было менструальное кровотечение невыясненного происхождения;
- Если у Вас гормонзависимая опухоль (когда течение заболевания ухудшается при воздействии гормонов).

Меры предосторожности при медицинском применении

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом перед началом применения препарата Клостилбегит® таблетки.

Таблетки Клостилбегит® следует принимать с осторожностью в следующих случаях:

- Если у Вас бесплодие или рано развилась менопауза
- Если у Вас нарушен менструальный цикл, в связи с низкой массой тела
- Если у Вас ранее были заболевания, сопровождающиеся судорогами
- Если у Вас фиброид матки
- Если у Вас поликистоз яичника
- Если у Вас увеличены яичники
- Если у Вас выявили гипертриглицеридемию (избыточное количество определенного типа жиров в крови) или такое состояние имеется у Ваших родственников в семье

Врач может назначить тщательное медицинское обследование до назначения Вам препарата Клостилбегит® с целью выявления причины бесплодия. Обязательно выполняйте указания врача.

Дети и подростки в возрасте до 18 лет
Детям и подросткам препарат Клостилбегит® таблетки противопоказан.

Другие лекарственные средства

и препарат Клостилбегит® таблетки

Сообщите Вашему лечащему врачу или фармацевту о любых лекарственных средствах, которые Вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать, включая препараты, отпускаемые без рецепта и препараты на основе лечебных растений. Это связано с тем, что препарат Клостилбегит® может изменить эффект некоторых лекарственных средств, а другие медицинские средства могут повлиять на эффект Клостилбегита.

Прием таблеток Клостилбегит® с пищей и напитками

Таблетки следует принимать один раз в день до еды.

Фертильность, беременность

и период грудного вскармливания

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете иметь ребенка, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту до начала применения этого препарата.

Беременность

После наступления беременности или при подозреваемой беременности Клостилбегит® противопоказан.

Грудное вскармливание

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом до начала приема кломифена, если Вы кормите грудью или планируете грудное вскармливание. Клостилбегит® может уменьшить количество грудного молока.

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед приемом любого лекарственного средства, если Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работу с механизмами

Поскольку в начале курса лечения может наступить ухудшение зрения, вождение транспортных средств и работа с механизмами не рекомендуются.

Каждая таблетка Клостилбегит® содержит 100 мг лактозы

Если Ваш врач сообщил Вам, что у Вас имеется непереносимость к некоторым видам сахаров, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом прежде, чем начать принимать этот препарат.

3. Как следует принимать препарат Клостилбегит® таблетки

Всегда принимайте таблетки Клостилбегит® строго по назначению врача. При любом сомнении обращайтесь к врачу или фармацевту. В связи с возможностью развития побочных реакций, пациентки должны пройти тщательное гинекологическое обследование перед началом лечения. Лечение препаратом Клостилбегит® назначается врачом-специалистом, препарат следует принимать только под постоянным контролем гинеколога.

Режим дозирования

Обычно рекомендуемые дозы для взрослых женщин:

- Ваш лечащий врач скажет Вам, на какой день менструального цикла Вам следует начать прием таблеток
- На протяжении первого курса лечения принимайте одну таблетку в день в течение 5 дней
- Если у Вас не появились месячные после первого курса лечения, Ваш лечащий врач повысит дозу до двух таблеток в день в течение 5 дней
- Вы должны начать второй курс лечения как минимум через 30 дней после первого курса
- Обычно, Вам не назначают более трех курсов лечения. Если овуляция отсутствует после трех курсов лечения, обратитесь к Вашему лечащему врачу

Способ применения

- Таблетки для приема внутрь
- Таблетки следует глотать целиком, не разжевывая и не разламывая, запивая небольшим количеством воды
- Таблетки Клостилбегит® следует принимать один раз в день, перед едой
- Не принимайте больше 2 таблеток/сутки
- Курс лечения не должен превышать 5 дней

Клостилбегит® противопоказан детям, подросткам и женщинам в постменопаузальном периоде.