

Залаин®вагинальный суппозиторий **300 мг****ИНСТРУКЦИЯ**по медицинскому применению
препарата

(информация для пациентов)

Залаин®вагинальный суппозиторий **300 мг**

(Сертаконазол)

Полностью и внимательно прочтите эту инструкцию до начала применения данного препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Сохраните этот листок. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство назначено именно Вам, не следует передавать его другим людям. Оно может нанести им вред, даже если у них наблюдаются такие же симптомы заболевания, как у Вас.
- Если у Вас возникнет какой-либо побочный эффект, или Вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту (см. раздел 4).

Данный листок-вкладыш содержит следующую информацию:

1. Что такое препарат Залаин® вагинальный суппозиторий и для чего его применяют
2. Что следует знать до начала применения препарата Залаин® вагинальный суппозиторий
3. Как следует применять препарат Залаин® вагинальный суппозиторий
4. Возможные побочные эффекты
5. Как следует хранить препарат Залаин® вагинальный суппозиторий
6. Срок годности
7. Условия отпуска из аптек
8. Содержимое упаковки и другая информация

1. Что такое препарат Залаин® вагинальный суппозиторий и для чего его применяют

Суппозитории Залаин® содержат в качестве действующего вещества сертаконазол, который представляет собой противогрибковый препарат группы имидазола, применяемый для местного лечения инфекций влагалища, вызываемых грибами рода кандиды.

2. Что следует знать до начала применения препарата Залаин® вагинальный суппозиторий

Не применяйте препарат Залаин® вагинальный суппозиторий:

- если у Вас аллергия к активному веществу или любому другому из вспомогательных веществ, приведенных в разделе 8
- если у Вас аллергия к любому другому противогрибковому лекарственному препарату из группы производных имидазола
- если Вы одновременно используете презервативы или диафрагмы из латекса (вагинальный суппозиторий может вызвать разрыв данных противозачаточных средств)

- обнаружение грибка в мазке из влагалища, но без характерных симптомов (ощущение жжения, зуда во влагалище, выделения из влагалища) само по себе не является показанием к применению препарата

Дети и подростки в возрасте до 18 лет

Отсутствуют рекомендации по применению препарата Залаин® вагинальные суппозитории у детей и подростков.

Другие лекарственные средства и препарат Залаин® вагинальный суппозиторий

Одновременное применение суппозитория Залаин® и местных спермицидных контрацептивных препаратов может снизить их спермицидный эффект, поэтому их одновременное применение не рекомендуется.

В период лечения не рекомендуется использовать мыло с кислым pH.

Фертильность, беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете иметь ребёнка, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту до начала применения этого препарата.

Беременность

В исследованиях на животных не выявлено вредного воздействия сертаконазола на плод.

Безопасность применения препарата у беременных женщин не изучалась.

Применение этого препарата во время беременности возможно, если по оценке врача потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода.

Грудное вскармливание

Безопасность применения препарата в период грудного вскармливания не изучалась.

Применение этого препарата в период грудного вскармливания возможно, если по оценке врача потенциальная польза для матери превосходит возможный риск для плода.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением любого лекарственного средства, если Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работы с механизмами:

Отсутствуют данные о том, что применение препарата Залаин® вагинальный суппозиторий могло бы повлиять на эти способности.

3. Как следует применять препарат Залаин® вагинальный суппозиторий

Всегда применяйте данный препарат строго соблюдая назначения врача. Если у Вас возникают вопросы, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.

Режим дозирования

Один вагинальный суппозиторий ввести глубоко во влагалище, в положении лежа на спине, вечером перед сном.

Если клинические симптомы заболевания сохраняются, можно ввести еще один суппозиторий через семь дней. При одновременной инфекции половых губ и прилегающих участков следует в период проведения лечения суппозиториями дополнительно применять на область наружных половых органов и околоанальную область препарат Залаин® крем.

Следует исключить другие возможные факторы, поддерживающие инфекцию (например, рекомендуется вместо белья из искусственного материала носить хлопчатобумажное белье, не рекомендуется излишняя, агрессивная гигиена влагалища и т.п.).

Необходимость одновременного лечения полового партнера определяется в индивидуальном порядке – при этом следует обратиться к Вашему лечащему врачу.

Если при половом акте используется презерватив, то суппозиторий следует ввести после полового акта.

Лечение можно продолжать и во время менструации.

Если суппозиторий вызывает раздражение в месте применения, лечение рекомендуется отменить.

Способ применения

Вагинальный суппозиторий Залаин® применяется интравагинально однократно.

Перед применением препарата необходимо обмыть наружные половые органы, используя нейтральное или щелочное мыло.

Если Вы применили больше суппозитория Залаин®, чем рекомендовано:

При внутривлагалищном применении передозировка практически невозможна.

Если Вы забыли применить суппозиторий Залаин®

Не применяйте двойную дозу для компенсации пропущенной.

Если Вы перестали применять суппозиторий Залаин®

С целью предотвращения рецидивов, необходимо полное излечение от грибковой инфекции, поэтому не прекращайте лечение раньше срока. Если у Вас возникнут дальнейшие вопросы по применению данного препарата, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные средства, данный препарат может вызвать нежелательные реакции, однако они проявляются не у каждого.

Нарушения со стороны иммунной системы:

Редко возможны аллергические реакции.

Общие расстройства и нарушения в месте введения:

Редко могут развиваться такие реакции, как ощущение жжения, зуда во влагалище, которые проходят во время лечения самостоятельно и не требуют отмены препарата. Причиной этого могут быть распадающиеся уничтоженные микроорганизмы, таким образом, это может быть и симптомом излечения.

Сообщение о побочных эффектах

При обнаружении любых побочных эффектов, в том числе и не упомянутых в данной инструкции, просьба обратиться к врачу или фармацевту.

Вы сможете сообщать о любых побочных эффектах через национальную систему регистрации побочных эффектов лекарственных средств. Благодаря Вашим сообщениям, Вы сможете получить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как следует хранить препарат Залаин® вагинальные суппозитории

Хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

6. Срок годности

Срок годности указан на упаковке.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности считается последний день указанного месяца.

Лекарственные средства не следует выбрасывать в бытовые отходы или сточные воды. Если необходимо удалить в отходы препарат, который больше не нужен, проконсультируйтесь с фармацевтом. Эти меры помогут предотвратить загрязнение окружающей среды.

Нельзя применять препарат Залаин® вагинальные суппозитории при появлении явных признаков ухудшения качества (например, изменении цвета).

7. Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту врача.

8. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит препарат Залаин® вагинальные суппозитории

Действующие вещества: сертаконазола нитрат 300 мг в каждом вагинальном суппозитории.

Вспомогательные вещества:

твердые полусинтетические глицериды витепсол и суппоцир, кремния диоксид коллоидный безводный.

Внешний вид препарата Залаин® вагинальные суппозитории и содержимое упаковки

Вагинальный суппозиторий.

Внешний вид

Белый воскообразный суппозиторий овальной формы, без запаха.

Упаковка

1 вагинальный суппозиторий упакован в блистер. 1 блистер вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

ВЛАДЕЛЕЦ ЛИЦЕНЗИИ НА МАРКЕТИНГ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС»
1106 БУДАПЕШТ, ул. Керестури, 30-38
ВЕНГРИЯ

Производитель

Троммсдорфф ГмбХ и Ко. КГ, Германия

по лицензии

ФЕРРЕР ИНТЕРНАСИОНАЛ А.О.

Барселона, Испания

EGIS Doc. No.: 32494/0