

Согласовано МЗ РБ 13 мая 2011 года

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

(информация для пациентов)

по медицинскому применению
лекарственного средства

Валерианы экстракт

Торговое название:

Валерианы экстракт

Лекарственная форма: таблетки,
покрытые оболочкой 20 мг

Описание: таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета, с двояковыпуклой поверхностью.

Состав:

каждая таблетка содержит – действующее вещество: экстракт валерианы густой – 20 мг,

вспомогательные вещества: магния карбонат основной, крахмал картофельный, тальк, желатин, сахар, двуокись титана пигментная, воск пчелиный, парафин, масло подсолнечное, хинолиновый желтый Е 104, кремния диоксид коллоидный.

Фармакотерапевтическая группа: прочие снотворные и седативные средства. АТХ - N05CM09.

Показания к применению

- неврастения и состояния, связанные с длительным нервно-психическим возбуждением;
- нарушения сна вследствие перевозбуждения, нервного стресса;
- легкие функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и пищеварительной системы (в составе комплексной терапии).

Противопоказания – Повышенная чувствительность к лекарственному средству. Беременность I триместр. Детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы

Взрослым по 40 - 80 мг (2 - 4 таблетки) 1 - 5 раз в день. При необходимости суточная доза может повышаться до 1000 мг в несколько (обычно 4 - 5) приемов. У лиц с нарушениями функции печени и почек коррекции дозы не требуется. Детям старше 12 лет назначают внутрь по 20 мг 2 - 3 раза в день.

Курс лечения – до 1 месяца.

Побочные действия

Сонливость, подавленность, снижение работоспособности, при длительном применении - запор. Редко - аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Лекарственное средство усиливает действие снотворных и седативных средств, а также спазмолитиков.

Особые указания

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Применение во время беременности и лактации

Применение лекарственного средства во время беременности (I триместр) противопоказано. Учитывая побочные действия лекарственного средства необходи-

мо соблюдать осторожность при применении в период лактации.

Передозировка Случаи передозировки лекарственных средств Валерианы экстракта не описаны. Симптомы: при использовании чрезмерно высоких доз (более чем в 20 раз превышающих максимально рекомендуемую дозу) могут возникать неспецифические симптомы, связанные с угнетением центральной нервной системы: вялость, заторможенность, сонливость. В тяжелых случаях возможно появление брадикардии и аритмии.

Лечение: отмена лекарственного средства, проведение желудочно-кишечного лаважа с использованием активированного угля, прием магния сульфата внутрь для предотвращения кишечной абсорбции лекарственного средства и обеспечения слабительного эффекта. Специфического антидота не существует.

Упаковка

В контурной ячейковой упаковке №10 в упаковке № 10 x 5.

В контурной ячейковой упаковке №25 в упаковке № 25 x 2.

Во флаконе № 50 в упаковке № 1.

Условия хранения

В защищенном от влаги месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева 64/27, тел/факс +375 (177)735612.

Штриховой код указан для таблеток Валерианы экстракт 20 мг, покрытых оболочкой №50 флакон без пачки



Штриховой код указан для таблеток Валерианы экстракт 20 мг, покрытых оболочкой №25 ПВХ/фольга в контурной ячейковой упаковке без пачки

