

БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми

4 мг/5 мл, раствор для приема внутрь

Действующее вещество: бромгексина гидрохлорид

Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочтите листок-вкладыш.

Данный препарат отпускается без рецепта. Тем не менее, для получения наилучшего результата от применения БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми его следует принимать с осторожностью.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если у Вас появятся дальнейшие вопросы, обратитесь к врачу или работнику аптеки.
- Если симптомы усугубились или не наступило улучшение по истечении 4-5 дней, обратитесь к врачу.
- При усугублении побочных действий или появлении любых других побочных действий, не описанных в данном листке-вкладыше, сообщите, пожалуйста, об этом лечащему врачу или работнику аптеки.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что представляет собой препарат БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми и для чего он используется
2. О чем следует знать перед применением препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми
3. Как принимать препарат БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми
4. Возможные побочные действия
5. Условия хранения препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми
6. Дополнительная информация

1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕПАРАТ БРОМГЕКСИН 4 БЕРЛИН-ХЕМИ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми представляет собой отхаркивающее средство (способствует разжижению мокроты при заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием вязкой мокроты).

БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми применяется для разжижения мокроты при острых и хронических заболеваниях бронхов и легких, сопровождающихся образованием густой мокроты.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА БРОМГЕКСИН 4 БЕРЛИН-ХЕМИ

Препарат БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми нельзя принимать, если:

- ▶ у Вас аллергия (гиперчувствительность) на бромгексина гидрохлорид или на любой другой компонент препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми.

Препарат БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми следует применять с особой осторожностью

В результате применения бромгексина в крайне редких случаях имели место тяжелые кожные реакции, например, синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла. При появлении каких-либо необычных изменений на коже и слизистых оболочках **немедленно** прекратите прием БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми и обратитесь к врачу.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом применения БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми в следующих случаях:

- ▶ Если Вы страдаете (или страдали в прошлом) язвой желудка или 12-перстной кишки, поскольку БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми способен нарушать барьерную функцию слизистой оболочки желудка и кишечника.
- ▶ При некоторых редких болезнях бронхов, сопровождающихся избыточным накоплением секрета (например, первичная первичная цилиарная дискинезия [дискинезия ресничек]). В этих случаях, в связи с возможным накоплением секрета, применение БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми допускается только под наблюдением врача.
- ▶ При нарушениях функции почек или серьезном заболевании печени (в этих случаях БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми применяется - по указанию врача - в уменьшенной дозе или с более длительными интервалами между приемами). При серьезных нарушениях функции почек возможно накопление продуктов распада БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми в печени.

Необходимо периодически проверять функцию печени, особенно при длительном лечении.

Дети

Применение БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми разрешается только у детей от 2 лет и под наблюдением врача.

Прием/применение других лекарственных средств

Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты (в том числе отпускаемые без рецепта), пожалуйста, предупредите об этом врача или работника аптеки.

При применении БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми в сочетании с противокашлевыми препаратами возможно опасное накопление секрета из-за подавления кашлевого рефлекса - поэтому перед назначением такого сочетания препаратов необходимо особенно тщательное обследование.

При применении препаратов, вызывающих симптомы раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, возможно усиление раздражения слизистой оболочки желудка под воздействием БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми.

Прием препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми с пищей и напитками

Особые рекомендации отсутствуют.

Беременность и кормление грудью

Перед тем, как принимать какие-либо лекарства, посоветуйтесь с врачом или работником аптеки.

До настоящего времени опыт применения этого препарата при беременности отсутствует; следовательно, применение БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми беременными допускается только после тщательной оценки врачом риска и пользы; не рекомендуется применять этот препарат в первом триместре беременности.

Бромгексин попадает в грудное молоко. Поскольку воздействие бромгексина на новорожденных детей изучено недостаточно, не следует принимать этот препарат во время кормления грудью.

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов

Особые рекомендации отсутствуют.

Важная информация о некоторых компонентах препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми

Из-за пропиленгликоля, входящего в состав препарата, БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми может вызывать у детей такие же симптомы, какие возникают после употребления алкоголя.

Данный лекарственный препарат содержит сорбит. В случае, если у Вас была установлена непереносимость каких-либо видов сахара, перед применением данного препарата проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Калорийность - 2,6 ккал/г сорбита. В одной мерной ложке содержится 2 г сорбита (источник 0,5 г фруктозы), что эквивалентно, приблизительно, 0,17 хлебной единицы. Возможно легкое слабительное действие препарата из-за содержащегося в нем сорбита.

3. КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕПАРАТ БРОМГЕКСИН 4 БЕРЛИН-ХЕМИ

Если Ваш врач не дал других рекомендаций, всегда принимайте БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми в точном соответствии с инструкциями на упаковке. Если Вы в чем-то не уверены, обратитесь к врачу или работнику аптеки.

Дозировка

Дозировка зависит от возраста пациентов, в соответствии с представленной ниже таблицей.

Пациенты	Дозировка
Взрослые и подростки старше 14 лет	по 2 – 4 мерные ложки три раза в день (что эквивалентно 24 – 48 мг бромгексина гидрохлорида в сутки)
Дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет, а также пациенты с массой тела менее 50 кг	по 2 мерные ложки три раза в день (что эквивалентно 24 мг бромгексина гидрохлорида в сутки)
Дети в возрасте до 6 лет	по 1 мерной ложке три раза в день (что эквивалентно 12 мг бромгексина гидрохлорида в сутки)

При нарушении функции почек или почечных заболеваниях тяжелой степени препарат применяют в меньших дозах или с более длительными интервалами. Проконсультируйтесь на этот счет со своим лечащим врачом.

Способ применения

Раствор для приема внутрь

В упаковку вложена мерная ложка объемом 5 мл. Отмеряйте дозы БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми мерной ложкой.

Примечание:

Рекомендуется принимать с достаточным объемом жидкости.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и у всех лекарств, у препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми тоже есть побочные действия, хотя развиваются они не у каждого.

Если Вы заметили появление у себя побочных действий, указанных ниже, прекратите прием препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми и немедленно обратитесь к врачу.

Побочные действия, возникающие иногда (встречаются у 1 – 10 из 1000 пациентов)

- ▶ Реакции гиперчувствительности: кожная сыпь, отек кожи и слизистых оболочек (ангионевротический отек), расстройства дыхания, зуд, крапивница.
- ▶ Лихорадка
- ▶ Тошнота, боль в животе, рвота, диарея

Побочные действия, возникающие очень редко (встречаются менее чем у 1 из 10 000 пациентов)

- ▶ Анафилактические реакции вплоть до шока (тяжелая форма реакции гиперчувствительности)

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТА БРОМГЕКСИН 4 БЕРЛИН-ХЕМИ

Хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми после истечения срока годности, указанного на картонной упаковке или на этикетке после слов «Годен до». Датой окончания срока годности является последний день указанного месяца.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми:

Действующим веществом препарата является бромгексина гидрохлорид.

В одной мерной ложке (5 мл) раствора БРОМГЕКСИНА 4 Берлин-Хеми содержится 4 мг бромгексина гидрохлорида.

Прочими компонентами являются пропиленгликоль, сорбит, концентрат абрикосового ароматизатора, 0,1 н. хлористоводородная кислота (3,5%-я HCl), вода очищенная.

Описание и форма выпуска препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми

Прозрачная, бесцветная, слегка вязкая жидкость во флаконе коричневого стекла с этикеткой, закрываемая заворачивающейся пластмассовой или алюминиевой крышкой. В каждой упаковке в качестве

Длительность применения

Длительность применения зависит от природы и тяжести заболевания и определяется лечащим врачом.

Если Ваши симптомы усугубились или по истечении 4-5 дней улучшения не наступило, обратитесь к врачу.

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, если Вам кажется, что воздействие препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми на Ваш организм слишком сильное или слишком слабое.

Случаи передозировки препаратом БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми

Симптомы передозировки, как правило, не выходят за пределы обычных побочных действий этого препарата. При тяжелых симптомах заболевания может потребоваться контроль кровообращения и, при необходимости, лечение, направленное на устранение симптомов.

Если ребенок проглотил большое количество препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми, немедленно обратитесь к врачу.

Если Вы забыли принять препарат БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми

Не принимайте двойную дозу препарата для компенсации пропущенной.

Если вы забыли принять БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми или приняли дозу ниже необходимой, в следующий раз примите обычную назначенную дозу.

Если вы прекратили принимать препарат БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми

Не прекращайте лечение без консультации с лечащим врачом. Это может усугубить Ваше заболевание.

Если у Вас имеются еще какие-либо вопросы по данному препарату, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

- ▶ Тяжелые кожные реакции, например, синдром Стивенса-Джонсона и синдром Лайелла в результате применения бромгексина (см. также раздел 2).

При первых признаках реакции гиперчувствительности, а также при появлении необычных изменений на слизистых оболочках прекратите прием препарата БРОМГЕКСИН 4 Берлин-Хеми. В подобном случае **немедленно** обратитесь к врачу.

При усугублении побочных действий или появлении любых других побочных действий, не описанных в данном листке-вкладыше, сообщите, пожалуйста, об этом лечащему врачу или работнику аптеки.

Условия хранения

Этот лекарственный препарат не требует специальных условий хранения.

Срок годности: 3 года

Стабильность после вскрытия емкости: После вскрытия данный лекарственный препарат стабилен при температуре не выше 25°C в течение 3 месяцев.

дозировочного элемента имеется мерная ложечка.

Оригинальная упаковка на 60 мл раствора

Оригинальная упаковка на 100 мл раствора

В продаже могут иметься упаковки не всех размеров.

Условия отпуска

Данный препарат отпускается без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ

(Менарини Групп)

Глиникер Вег 125

12489 Берлин, Германия

Дата последнего утверждения

данного листка-вкладыша

Июль 2011 г.