

Геделикс® сироп от кашля

Действующее вещество: густой экстракт листьев плюща

Внимательно прочитайте инструкцию по применению перед тем как начать прием препарата, поскольку инструкция содержит важную для Вас информацию.

Применяйте препарат согласно настоящей инструкции или в соответствии с рекомендациями врача или фармацевта.

- Сохраните эту инструкцию по применению на случай, если Вы захотите перечитать ее.
- Если Вам требуется дополнительная информация или совет, обратитесь к фармацевту.
- В случае проявления каких-либо побочных действий, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту. Это касается также побочных действий не указанных в настоящей инструкции (раздел 4).

В инструкции по применению содержится следующая информация:

1. Что такое Геделикс® сироп от кашля и для чего он применяется?
2. На что следует обратить внимание перед началом применения препарата Геделикс® сироп от кашля?
3. Каким образом следует применять Геделикс® сироп от кашля?
4. Какие побочные реакции возможны?
5. В каких условиях следует хранить Геделикс® сироп от кашля?
6. Содержимое упаковки и другая информация

1. ЧТО ТАКОЕ ГЕДЕЛИКС® СИРОП ОТ КАШЛЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОН ПРИМЕНЯЕТСЯ?

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05CA

Геделикс® сироп от кашля – это лекарственное средство растительного происхождения, применяется для лечения простудных заболеваний дыхательных путей и для симптоматического лечения хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Если жалобы сохраняются в течение длительного времени или при возникновении одышки, повышении температуры, а также при отхождении гнойной мокроты или мокроты с кровью, следует незамедлительно обратиться к врачу.

2. НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ГЕДЕЛИКС® СИРОП ОТ КАШЛЯ?

Геделикс® сироп от кашля нельзя применять:

- при повышенной чувствительности (аллергии) к листьям плюща или другим компонентам препарата, перечисленным в разделе 6;
- детям до 2-х лет, в связи с риском развития респираторных симптомов;
- при дефиците фермента аргининсукцинатсинтетазы (нарушение обмена в цикле мочевины).

Особые указания и меры предосторожности

Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом перед началом приема Геделикс® сироп от кашля.

Применение препарата Геделикс® сироп от кашля у детей в возрасте до 4-х лет возможно только по назначению врача.

Не рекомендуется без назначения врача одновременный прием с другими противокашлевыми препаратами, такими как, например, кодеин или декстрометорфан.

Пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка необходимо соблюдать осторожность при приеме препарата.

Прием препарата Геделикс® сироп от кашля одновременно с другими лекарственными средствами:

Взаимодействия с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестны.

Тем не менее, сообщите, пожалуйста, Вашему врачу или фармацевту, если Вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать другие лекарственные средства.

Одновременный прием препарата Геделикс® сироп от кашля вместе пищевыми продуктами и напитками:

Особых мер предосторожности не требуется.

Беременность и кормление грудью:

Если Вы беременны, кормите грудью, предполагаете, что беременны или планируете забеременеть, сообщите об этом Вашему лечащему врачу или фармацевту до начала приема препарата.

Геделикс® сироп от кашля не следует применять в период беременности и кормления грудью, в связи с отсутствием достаточных данных о безопасности.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами:

Особых мер предосторожности не требуется.

Геделикс® сироп от кашля содержит сорбитол.

Если Вы страдаете непереносимостью определенных сахаров, то, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом до начала приема препарата Геделикс® сироп от кашля.

5 мл сиропа содержат 1,75 г сорбитола (соответствует 0,44 г фруктозы).

3. КАКИМ ОБРАЗОМ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ГЕДЕЛИКС® СИРОП ОТ КАШЛЯ?

Геделикс® сироп от кашля следует применять в точном соответствии с настоящей инструкцией по применению или рекомендациями врача или фармацевта. Если у Вас возникли какие-либо сомнения, обратитесь к Вашему врачу или фармацевту.

Рекомендуемая дозировка (если врач не назначил иначе):

Взрослые и дети старше 10-ти лет:

по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки

Дети от 4-х до 10-ти лет:

по ½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа 4 раза в сутки

Дети от 2-х до 4-х лет:

по ½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа 3 раза в сутки

Способ применения

Для приема внутрь.

Геделикс® сироп от кашля рекомендуется принимать неразбавленным и запивать достаточным количеством жидкости (желательно воды).

Продолжительность приема

Длительность приема препарат Геделикс® сироп от кашля без консультации с врачом не должна превышать нескольких дней. См. также раздел «Что такое Геделикс® сироп от кашля и для чего он применяется».

Если у Вас создается впечатление, что действие препарата слишком сильное или слишком слабое, пожалуйста, обсудите это с Вашим врачом или фармацевтом.

Если Вы приняли большее количество препарата Геделикс® сироп от кашля, чем следовало

Если Вы по ошибке приняли на одну или две разовые дозы (например, для взрослых на одну или две мерные ложки (на 5 мл или 10 мл) больше, чем следовало, это, как правило, не повлечет за собой никаких нежелательных реакций. Принятие намного больших доз может вызвать тошноту, рвоту и понос. В этом случае Вам следует обратиться к врачу.

Если Вы забыли принять Геделикс® сироп от кашля

Если Вы забыли принять Геделикс® сироп от кашля, то в следующий раз Вам не нужно принимать двойную дозу препарата. Продолжайте принимать препарат в соответствии с назначениями врача или настоящей инструкцией по применению.

4. КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ВОЗМОЖНЫ?

Как и все лекарственные средства Геделикс® сироп от кашля может вызывать побочные реакции, но они возникают не у каждого пациента.

Частота возникновения побочных реакций, перечисленных ниже, оценивается следующим образом:

Очень часто:	может встречаться более чем у 1-го пациента из 10-ти
Часто:	менее чем у 1-го пациента из 10-ти, но более чем у 1-го пациента из 100
Иногда:	менее чем у 1-го пациента из 100, но более чем у 1-го пациента из 1000
Редко:	менее чем у 1-го пациента из 1000, но более чем у 1-го пациента из 10000
Очень редко:	менее чем у 1-го пациента из 10000
Неизвестно:	невозможно определить частоту встречаемости побочной реакции на основании имеющихся данных

Возможные побочные реакции:

Расстройства иммунной системы

Очень редко: после приема препаратов содержащих плющ наблюдались аллергические реакции, такие как одышка, отеки, эритема и зуд.

Расстройства желудочно-кишечного тракта

Нечасто у лиц с повышенной чувствительностью: расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, понос).

В случае выраженного проявления одной из приведенных побочных реакций или побочных действий, не указанных в настоящей инструкции, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту.

5. В КАКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ГЕДЕЛИКС® СИРОП ОТ КАШЛЯ?

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

Срок годности препарата Геделикс® сироп от кашля составляет 3 года.

Срок годности после вскрытия флакона - 6 месяцев.

Не следует принимать препарат после истечения срока годности «Годен до ...», указанного на картонной пачке и этикетке. Датой истечения срока годности считается последний день месяца, указанного на упаковке.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что содержит Геделикс® сироп от кашля

Действующее вещество: густой экстракт листьев плюща.

100 мл сиропа содержат: 0,8 г экстракта густого *Hedera helix* L., folium (плюща листьев) (2,2 – 2,9:1).

Экстрагент: этанол 50 об.% : пропиленгликоль – (98 : 2 м/м).

Готовый продукт не содержит спирта (этанола).

Вспомогательные вещества:

макроглицерина гидроксистеарат, масло аниса звездчатого, гидроксиэтилцеллюлоза, сорбитола раствор (некристаллизующийся), пропиленгликоль, глицерин, вода очищенная.

Как выглядит Геделикс® сироп от кашля и содержимое упаковки:

Геделикс® сироп от кашля - густоватая жидкость от желтого до желто-коричневого цвета, своеобразного запаха; возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на качество и действие препарата.

Геделикс® сироп от кашля выпускается во флаконах по 100мл.

Наименование и адрес владельца регистрации и производителя

Кревель Мойзельбах ГмбХ,

Кревельштрассе 2,

53783 Айторф,

Германия

Тел.: + 49 (0) 2243-87-0

Факс: + 49 (0) 2243-87-175

e-mail: info@krewelmeuselbach.de

Данная инструкция по применению в последний раз редактировалась в мае 2016 года.

3201591521 AM