

online-apteka.am
УТВЕРЖДЕНО
Фармакологическим Советом Министерства
здравоохранения Республики Армения

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)

online-apteka.am
АНТИ-АКНЕ
Суспензия для наружного применения

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РА: № 12419

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Анти-Акне

online-apteka.am
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ:
Салициловая кислота, Сера осажденная, Цинка окись
(Salicylic acid, Sulfur precipitated, Zinc oxide)

online-apteka.am
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: суспензия для наружного применения.

СОСТАВ

Каждый мл содержит:

online-apteka.am
активные вещества: салициловая кислота - 20. мг, сера
осажденная - 50 мг, цинка окись - 150 мг;
вспомогательные вещества: этиловый спирт (50%),
камфора, вода очищенная.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА

Дерматологический препарат.

КОД АТХ

D02AF; D10AB02.

online-apteka.am
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Препарат для наружного применения. Салициловая кислота подавляет секрецию сальных и потовых желез. В низких концентрациях оказывает кератопластическое, а в высоких - кератолитическое действие. Обладает слабой противомикробной активностью. При нанесении суспензии на кожу сера взаимодействует с органическими веществами, образуя сульфиды и пентатионовую кислоту, которые оказывают противомикробное и противопаразитарное действие.

online-apteka.am
Цинка окись оказывает подсушивающее, адсорбирующее и вяжущее действие. Уменьшает эксудацию, что снимает местные явления воспаления и раздражения.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Распределение: при неповрежденных кожных покровах цинка оксид и сера осажденная проникают в кожу, но не накапливаются в сыворотке крови. Салициловая кислота всасывается в небольшом объеме.

Метаболизм: салициловая кислота метаболизируется частично в дигидроксibenзойную кислоту.

Выведение: салициловая кислота и ее метаболит выводятся главным образом почками.

online-apteka.am
ПОКАЗАНИЯ

- Обыкновенные угри (Acne vulgaris).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

online-apteka.am
Препарат 1-3 раза/сут наносят на вымытую, сухую поверхность пораженного участка кожи очень тонким слоем и распределяют равномерно пальцем.

Для избегания чрезмерного высыхания кожи, обычно лечение начинают с разовым нанесением препарата в сутки, при необходимости постепенно увеличивая кратность применения.

online-apteka.am
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Побочное действие, связанное с применением салициловой кислоты: дерматит. При нанесении на кожи салициловая кислота быстро всасывается и может наблюдаться острое системное салицилатовое отравление при чрезмерном применении.

Побочное действие, связанное с применением серы: при применении соответствующих доз, препараты для местного применения, содержащие серу, имеют низкую токсичность. Могут наблюдаться местные реакции в виде раздражения кожи, глаз и дыхательных путей. Повторные нанесения могут вызвать дерматит.

Побочное действие, связанное с применением оксидом цинка: не выявлено.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

online-apteka.am
-Повышенная чувствительность к салициловой кислоте, препаратам серы и цинка оксиду;
- детский возраст до 12 лет.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

online-apteka.am
Следует избегать попадания препарата в глаза, рот, на

слизистые оболочки; в случае попадания - немедленно смыть водой. Для минимизации всасывания после местного применения салициловой кислоты необходимо избегать применение препарата в длительное время в высоких концентрациях на большие поверхности кожи. Необходимо учитывать, что при кожных заболеваниях, протекающих с гиперемией и воспалением или с поверхностными мокнущими поражениями, также возможно повышение всасывания салициловой кислоты. Следует с осторожностью применять препарат у больных с ослабленным периферическим кровоснабжением конечностей или диабетом. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении щелочных препаратов у больных с значительной периферической нейропатией. Сера может обесцветить серебро. При одновременном применении препарата с наружными препаратами, содержащими ртуть, может наблюдаться образование гидроген сульфида, который имеет отвратительный запах и может оставить черное пятно на коже.

При проявлении побочных действий следует временно прекратить применение препарата до исчезновения этих симптомов. **Анти-Акне** нельзя применять одновременно с другими противоугревыми препаратами.

БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ

Избегать применения препарата при беременности и в период кормления грудью (лактации).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

В связи с низкой абсорбцией препарата передозировка маловероятна.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных препаратов для местного применения и тем самым усилить их всасывание.

Всасавшаяся салициловая кислота может усилить побочные эффекты метотрексата и пероральных гипогликемических лекарственных препаратов, производных сульфонилмочевины.

Суспензия фармацевтически несовместима с резорцином (образует расплавляющиеся смеси).

ФОРМА ВЫПУСКА И УПАКОВКА

Суспензия для наружного применения во флаконах по 30 мл вместе с листком-вкладышем в пачке из картона.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранить при комнатной температуре, в сухом и недоступном для детей месте. Срок годности - 3 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Отпускается без рецепта врача.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайки марз,

г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19

Тел.: 374 (222) 21703, 21740

Факс: 374 (222) 21924

Эл. почта: management@arpimed.am

Эл. адрес: www.arpimed.am