

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(аннотация-вкладыш)

БИСАКОДИЛ

Bisacodyl

Международное непатентованное название (МНН) – *Bisacodyl*;

Описание лекарственной формы: суппозитории цилиндрической формы белого или белого с желтоватым оттенком цвета. На продольном срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

Состав лекарственной формы

Один суппозиторий содержит:

активное вещество: бисакодил 10 мг;

вспомогательные вещества: твердый жир.

Форма выпуска суппозитории ректальные.

Фармакотерапевтическая группа Слабительные препараты. Контактные слабительные препараты.

Код АТС: A06AB02.

Фармакологические свойства

Бисакодил – производное дифенилметана. Оказывает слабительное, ветрогонное действие. **Фармакодинамика** Механизм действия обусловлен прямой стимуляцией нервных окончаний слизистой оболочки толстой кишки, повышая продукцию слизи в толстой кишке, что приводит к размягчению кала, улучшению его скольжения, способствуя акту дефекации, а также ускорением и усилением перистальтики кишечника.

Фармакокинетика Бисакодил не абсорбируется из толстого кишечника и не проникает в грудное молоко. При ректальном введении выраженный слабительный эффект наступает в течение часа (15-60 минут).

Показания Запор, обусловленный гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки (в частности, у пожилых пациентов; запоры после операций, родов, смены диеты). Регулирование стула при геморрое, проктите, анальных трещинах. Подготовка толстого кишечника к хирургическим вмешательствам, рентгенологическим и инструментальным исследованиям.

Противопоказания

Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, спастический запор; ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, боли в животе неясного генеза, перитонит, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, маточные кровотечения, цистит, острый проктит, острый геморрой).

Особенности применения

Не применять препарат в течение длительного времени.

С осторожностью назначают бисакодил пациентам с печеночной и/или почечной недостаточностью.

Во время применения препарата следует употреблять большое количество жидкости с целью обеспечения нормальной консистенции каловых масс.

Если при применении бисакодила начнется кровотечение из прямой кишки, прием препара-

та следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Учитывая, что бисакодил не всасывается из кишечника, взаимодействие с другими препаратами маловероятно.

Беременность и лактация

Следует соблюдать осторожность при применении препарата в период беременности или лактации.

Влияние на способность к вождению и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами.

Способ применения и дозы

Ректально. Взрослым и детям старше 14 лет – 10-20 мг бисакодила (1-2 суппозитория) в сутки; детям в возрасте 8-14 лет – по 10 мг (1 суппозиторий) в сутки, 2-7 лет – по 5 мг (1/2 суппозитория) в сутки. При подготовке к оперативному вмешательству или к диагностическим исследованиям вечером и утром по 10 мг (1 суппозиторий).

Передозировка

Симптомы: диарея, нарушение водно-электролитного баланса, гипокалиемия, атония толстой кишки.

Лечение: симптоматическое.

Побочные действия и реакции

Кишечная колика; диарея, которая может привести к дегидратации, нарушению водно-электролитного обмена, развитию мышечной слабости, судорог, артериальной гипотонии; аллергические реакции.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25° С.

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускать без рецепта врача.

Упаковка

Суппозитории ректальные по 10 мг. По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/ПЭ пленки. По 2 контурные ячейковые упаковки № 5 вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Производитель

ООО "ФАРМАПРИМ"

ул. Кринилор, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,

Республика Молдова, MD-4829

www.farmaprim.md