

online-apteka.am

 Hemofarm A.D.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата
для медицинского применения

ГЕПАТРОМБИН

Регистрационный номер: П N013949/01, П N013949/02

Торговое название препарата: Гепатромбин

Лекарственная форма: мазь для наружного применения, гель для наружного применения

Состав

100 г мази содержат:

активные вещества – гепарин натрия 30 000 МЕ,
аллантоин 0,30 г, декспантенол 0,40 г;
вспомогательные вещества - бронопол – 0,10 г,
карбомер – 0,66 г, воск микрокристаллический
– 6,00 г, триэтилмакрогола фосфат – 3,00 г,
левоментол – 0,15 г, парафин жидкий – 6,00 г,
пурцелинол – 3,00 г, жирных кислот глицериды
– 6,15 г, динатрия эдетат – 0,10 г, троламин –
0,22 г, вазелин – 5,00 г, вода очищенная –
68,40 мл.

100 г геля содержат:

активные вещества – гепарин натрия 30 000
МЕ, аллантоин 0,250 г, декспантенол 0,250 г;
вспомогательные вещества – карбомер – 0,933 г,
левоментол – 0,020 г, динатрия эдетат – 0,100 г,
троламин – 0,550 г, сосны горной хвои масло
– 0,080 г, сосны обыкновенной хвои масло
– 0,080 г, лимона масло – 0,020 г, сорбитол
– 2,000 г, изопропанол – 25,37 г, софтиген
767(макрогола-6-глицерилкаприлокапрат)–
0,200 г, полисорбат – 0,500 г, вода очищенная
– 68,485 мл.

Описание

Белая, однородная мазь, с характерным
запахом.

Бесцветный, прозрачный гель, с характерным
запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

антикоагулянтное средство прямого действия
для местного применения.

Код АТХ:

[C05 BA53].

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат для местного
применения. Гепарин препятствует
образованию тромбов, обладает
противоотечным и противовоспалительным
действием, улучшает местный кровоток.
Аллантоин оказывает противовоспалительное
действие, стимулирует обменные процессы в
тканях и способствует пролиферации клеток.
Декспантенол улучшает всасывание гепарина,
стимулирует грануляцию и эпителизацию
тканей.

Показания к применению

Тромбоз, тромбоз, варикозное
расширение вен; трофические язвы голени
(для мази); спортивные травмы, тендовагинит;
воспалительные инфильтраты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам
препарата, нарушение целостности кожных
покровов (для геля), инфицированные
повреждения кожных покровов.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Возможно применение препарата во II и III
триместре беременности. С осторожностью
следует назначать в I триместре беременности.
Возможно применение в период грудного
вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно.

Наносят столбик мази длиной 5 см, не втирая, 2 раза в день (утром и вечером) в течение 10-14 дней. При лечении заболеваний вен препарат применяют в виде повязок с мазью. При трофических язвах (без нарушений целостности кожных покровов) мазь наносится в виде кольца шириной около 4 см. При заболеваниях вен нижних конечностей мазь наносят легкими втирающими движениями по направлению снизу вверх. Разовую дозу рекомендуется втирать не полностью, а отдельными порциями. Рекомендуют курс лечения препаратом 1 месяц.

Наружно.

Около 5 см геля наносят тонким слоем, втирая легкими массирующими движениями снизу вверх 2 раза в день (утром и вечером) в течение 10-14 дней (при тромбозах и тромбофлебитах массирование не рекомендуется).
Рекомендуют курс лечения препаратом 1 месяц.

Побочное действие

Аллергические реакции (кожная сыпь, гиперемия кожи, крапивница, ангионевротический отек).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения (300 ME + 4 мг + 3 мг)/г.

По 40 г мази в алюминиевую тубу, укупоренную навинчивающейся крышечкой из пластмассы. Отверстие тубы защищено алюминиевой мембраной. Крышечка представляет собой монолитную конструкцию, включающую в себя приспособление для прокалывания мембраны. Туба вместе с инструкцией по применению помещается в пачку картонную.

Гель для наружного применения (300 ME + 2,5 мг + 2,5 мг)/г.

По 40 г геля в алюминиевую тубу, укупоренную навинчивающейся крышечкой из пластмассы. Отверстие тубы защищено алюминиевой мембраной. Крышечка представляет собой монолитную конструкцию, включающую в себя приспособление для прокалывания мембраны. Туба вместе с инструкцией по применению помещается в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 до 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Мазь:

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Гель:

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Мазь:

Производитель:

Хемофарм А.Д., Сербия
26300 г. Вршац, Београдский путь бб, Сербия
тел.: 13/803100, факс.:13/803424

Претензии потребителей направлять по адресу:

Россия, 603950, г. Нижний Новгород ГСП-458,
ул. Салганская, 7
и по тел.: (495) 221-70-40, факс:
(495) 221-70-46.

Гель:

Производитель/фасовщик/ упаковщик

Хемофарм А.Д. Вршац, отделение
Производственная площадка Шабац, Сербия
15000, г. Шабац, ул. Хайдук Велькова бб

Владелец регистрационного удостоверения/выпускающий контроль качества

Хемофарм А.Д., Сербия
26300, г. Вршац, Београдский путь бб

Организация, принимающая претензии

АО «Нижфарм», Россия
603950, г. Нижний Новгород, ГСП-459, ул.
Салганская, д. 7
Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28
E-mail: med@stada.ru