

коиды и антибиотика) может наблюдаться развитие вторичной инфекции вследствие подавления защитной реакции организма больного. При острых гнойных заболеваниях глаза глюкокортикоиды могут замаскировать или усилить имеющийся инфекционный процесс.

Грибковое поражение роговицы (микозы роговицы) имеет тенденцию возникать особенно часто при длительном (более трех месяцев) применении глюкокортикоидов. Появление на роговице незаживающих язв после длительного лечения препаратами, содержащими глюкокортикоиды, может свидетельствовать о развитии грибковой инвазии.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к любому компоненту препарата;
- эпителиальный кератит, вызванный *Herpes simplex* (древовидный кератит);
- вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы (в т.ч. ветряная оспа);
- микобактериальные инфекции глаз;
- грибковые заболевания глаз;
- трахома, глаукома, туберкулез глаз;
- неврит слухового нерва;
- хроническая почечная недостаточность;
- миастения;
- паркинсонизм;
- беременность (препарат может стать причиной необратимой глухоты плода).

Препарат не назначают после неосложненного удаления инородного тела из роговицы.

С осторожностью: детский возраст.

Беременность и лактация

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью и у детей нет. Применение Дексатоброма у беременных женщин противопоказано, так как может стать причиной необратимой глухоты плода (см. «Противопоказания»). На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Влияние на способность вождения автотранспорта и работы со специальным оборудованием

Применение ДЕКСАТОБРОМА не вызывает повышенной утомляемости и нарушений зрения, поэтому не влияет на способность вождения автотранспорта и управления механизмами. Пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость зрения, не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой сразу после закапывания препарата.

Особые указания

ДЕКСАТОБРОМ предназначен только для местного применения (не применяется для инъекций).

При применении препаратов, содержащих ГКС, более 10 дней следует регулярно измерять внутриглазное давление.

При назначении препарата ДЕКСАТОБРОМ одновременно с антибиотиками группы аминогликозидов для системного применения, нужно контролировать концентрацию тобрамицина в сыворотке крови.

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

Перед применением следует встряхнуть содержимое флакона.

Использование в педиатрии

В настоящий момент безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата ДЕКСАТОБРОМ не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие

Лекарственное взаимодействие препарата ДЕКСАТОБРОМ не установлено.

Условие отпуска из аптек

Отпускается из аптек по рецепту врача.

Условия хранения и срок годности

Срок годности 3 года при хранении в закрытой оригинальной упаковке.

После вскрытия флакона капли следует использовать в течение 4 недель.

Хранить при температуре 15°-25°С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска и упаковка

Полимерный флакон-капельница, закрытый полимерной крышкой с предохранительным кольцом, содержащий 5 мл стерильной суспензии (глазных капель), и инструкция в картонной коробке.

Производитель

РОМФАРМ КОМПАНИ, Отопень, Румыния.