

ДИАЗОЛИН-ФАРМАК

Mebhydrolin

Драже

Таблетки

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Внимательно прочитайте этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Сохраняйте этот листок-вкладыш. Вам может понадобиться перечитать его.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом.

Этот препарат предназначен лично Вам, и не следует передавать его другим лицам.

Это может причинить вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания подобны тем, которые наблюдаются у Вас.

Состав лекарственного средства.

Действующее вещество: 1 драже содержит мебгидролина 50 мг (0,05 г) или 100 мг (0,1 г);

1 таблетка содержит мебгидролина в пересчете на 100 % вещество 100 мг;

вспомогательные вещества (драже): сахароза, патока крахмальная, тальк, воск пчелиный, масло подсолнечное;

вспомогательные вещества (таблетки): лактозы моногидрат, крахмал картофельный, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский), сахароза, кальция стеарат.

Лекарственная форма. Драже. Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа. Антигистаминные средства для системного применения. **Фармакодинамика.** Мибгидролин относится к антигистаминным препаратам, является блокатором H₁-рецепторов гистамина. Мибгидролин ослабляет спазмогенный эффект гистамина в отношении гладких мышц бронхов, кишечника, а также его влияние на проницаемость сосудов. В отличие от антигистаминных препаратов первого поколения (димедрол, супрастин и др.) имеет менее выраженный седативный и снотворный эффект. Имеет слабовыраженные м-холиноблокирующее и анестезирующие свойства.

Фармакокинетика. Быстро всасывается из пищеварительного тракта. Биодоступность колеблется в пределах 40-60 %. Терапевтический эффект развивается спустя 15-30 минут, максимальное действие наблюдается через 1-2 часа. Продолжительность эффекта может достигать 2 суток. Препарат практически не проникает через гематоэнцефалический барьер, метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует ферменты печени, выводится из организма почками.

Показания. Симптоматическое лечение аллергических состояний, проявляющихся крапивницей, ринитами, кожным зудом.

Противопоказания. Гиперчувствительность к компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, другие воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, гипертрофия предстательной железы, пилоростеноз. Детский возраст до 6 лет.

Предостережения при применении. Диазолин-Фармак с осторожностью назначают при тяжелой печеночной и/или почечной недостаточности. Препарат не рекомендуется назначать при закрытоугольной глаукоме, эпилепсии, нарушениях сердечного ритма, при гипертрофии предстательной железы.

Во время лечения Диазолином-Фармак употребление алкогольных напитков не рекомендуется.

У детей иногда наблюдаются парадоксальные реакции: повышенная возбудимость, тремор, нарушения сна. Не рекомендуется применять для лечения детей в возрасте до 6 лет.

Применение Диазолина-Фармак во время беременности и кормления грудью возможно только по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск возможных побочных реакций.

Влияние на способность управлять автотранспортом и работать со сложными механизмами. При применении препарата не рекомендуется управлять автотранспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, нуждающимися в концентрации внимания.

Без консультации врача не применяйте препарат дольше срока, указанного на упаковке!

Взаимодействие с лекарственными средствами.

Если Вы принимаете какие-нибудь другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно возможности применения препарата!

Диазолин-Фармак потенцирует действие снотворных (нитразепама, зопиклона), седативных (корвалола, бромкамфоры) и других препаратов, влияющих на тормозные процессы в центральной нервной системе (феназепама, мебикара), а также алкоголя.

Способ применения и дозы. Диазолин-Фармак назначают внутрь, после еды, взрослым и детям с 12 лет, по 100 мг – 200 мг, 1-2 раза в день. Высшие дозы для взрослых: разовая – 300 мг, суточная – 600 мг. Детям в возрасте 6-12 лет назначают по 50 мг, 2-3 раза в день.

Длительность лечения определяется характером заболевания и достигнутым терапевтическим эффектом.

Передозировка. При передозировке препарата повышается риск возникновения побочных явлений, приведенные в соответствующем разделе. В этом случае препарат нужно отменить, провести промывание желудка и немедленно обратиться к врачу.

Побочные эффекты. Со стороны пищеварительной системы: Диазолин-Фармак может раздражать слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, которые иногда проявляются диспепсическими явлениями (изжога, тошнота, боли в эпигастральной области и др.).

Со стороны центральной нервной системы: головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, сонливость, нечеткость зрительного восприятия, замедление скорости реакций.

Другие: сухость во рту, нарушения мочеиспускания, аллергические реакции. Крайне редко возможно возникновение гранулоцитопении и агранулоцитоза.

Срок годности. Драже - 3,5 года. Таблетки – 2 года.

Не применяйте препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Условия хранения. Драже хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.

Таблетки хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 10 драже в блистере; по 1 или 2 блистера, вложенных в пачку.

По 10 таблеток в блистере. По 1 или 2 блистера, вложенных в пачку.

Правила отпуска. Без рецепта.

Название и адрес производителя. ПАО “Фармак”. 04080, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.