

Инструкция

по медицинскому применению препарата

ДИСФЛАТИЛ (DISFLATYL®)

(информация для пациентов)

Торговое название препарата: Дисфлатил (Disflatyl®)

Международное непатентованное название: Симетикон

Лекарственная форма: капли для приема внутрь
Непрозрачная беловатая эмульсия с запахом ананаса.

Состав

действующее вещество: симетикон;

1 мл препарата содержит симетикона 40 мг, в 1 мл 27 ± 3 капли;
вспомогательные вещества: бензойная кислота (E210), натрия бензоат (E211), натрия сахаринат, ароматизатор ананасовый, полиоксиэтилена (2) стеарат, полиоксиэтилена (20) стеарат, вода очищенная.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при функциональных нарушениях кишечника. Силиконы.

Код препарата по АТХ A03A X13.

Фармакологические свойства

Активный компонент препарата **Дисфлатил** – симетикон – представляет собой нетоксичное кремнийсодержащее соединение, обладающее поверхностной активностью и пеногасящими свойствами. Благодаря своим физико-химическим свойствам симетикон является химически и физиологически инертным веществом, нетоксичным и не абсорбируемым мембраной клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Симетикон разрушает пузырьки газа физическим путем, изменяя их поверхностное натяжение и, тем самым, заставляя их спадаться. Благодаря данному свойству симетикон используется при симптоматическом лечении избыточного газообразования в области желудочно-кишечного тракта. Высвобождаемый газ затем выводится естественным способом.

Показания к применению

Дисфлатил капли применяются для симптоматического лечения всех типов избыточного газообразования и скопления газов в желудочно-кишечном тракте: пучение, вздутие живота, метеоризм, в том числе – послеоперационный метеоризм, аэрофагия. Применение **Дисфлатила** капель уменьшает чувство переполнения и ощущение напряжения в животе.

По назначению врача **Дисфлатил** капли применяется для подготовки к эндоскопическим, рентгенологическим, ультразвуковым, сонографическим исследованиям желудка и/или кишечника для вывода газов и воздуха из желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания

Кишечная непроходимость, сопровождающаяся сильными коликами и рвотой. В этих случаях следует немедленно обратиться к врачу. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

1. Симптоматическое лечение всех типов избыточного газообразования и скопления газов в желудочно-кишечном тракте

Взрослые: по 25-50 капель, по возможности, сопровождая прием капель небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном (3-5 раз в день).

Дети школьного возраста: по 15-20 капель, по возможности, сопровождая прием капель небольшим количеством жидкости, после каждого приема пищи и перед сном (3-5 раз в день).

Дети первого года жизни и дети дошкольного возраста (дети до 6 лет): по 10-15 капель 2-3 раза в день во время еды или после еды.

2. Профилактический прием при подготовке к исследованию желудка и/или кишечника.

По 50 капель 3-4 раза в день в течение 2 дней, предшествующих исследованию, 50 капель утром, натощак в день исследования и 50 капель непосредственно перед исследованием.

Перед употреблением флакон с каплями необходимо хорошо встряхнуть!

Побочное действие

Поскольку активный компонент **Дисфлатила** капель – симетикон – не абсорбируется в желудочно-кишечном тракте и выводится из организма в неизменном виде, препарат считается безопасным и не оказывает побочных эффектов.

В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата: сыпь на коже, зуд, гиперемия.

Передозировка

До настоящего времени неизвестны случаи применения чрезмерной дозы препарата.

Особые указания

Прием Дисфлатила каплей больными диабетом.

Дисфлатил капли не содержит сахара. Препарат содержит синтетический подсластитель – натрия сахаринат. Поэтому препарат может применяться больными диабетом.

Прием Дисфлатила каплей при беременности и в период кормления грудью.

Специальные исследования ни на людях, ни на животных не проводились.

Поскольку активный компонент препарата – симетикон – не абсорбируется в желудочно-кишечном тракте и выводится в неизменном виде, то применение **Дисфлатила** каплей во время беременности не оказывает влияние на развитие плода; в период кормления грудью препарат не проникает в материнское молоко.

Прием Дисфлатила каплей при работе с механизмами и вождении автотранспорта.

Препарат не оказывает системного воздействия на организм и может применяться при вождении автотранспорта и при работе с механизмами.

В случае если Вы страдаете другими заболеваниями, склонны к аллергическим реакциям или принимаете другие лекарственные препараты (в том числе купленные самостоятельно), необходимо предварительно проконсультироваться с врачом.

При продолжительных и повторяющихся нарушениях пищеварения, необходимо установить причину данных явлений. Здесь речь может идти о неправильном питании или о недостатке двигательной активности. Если также имеют место органические нарушения или нарушения со стороны нервной системы, во всех перечисленных случаях необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение Дисфлатила в педиатрии

Препарат применяется в педиатрической практике.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и продуктами питания

Не требуется особых мер предосторожности при применении **Дисфлатила** капли одновременно с другими лекарственными средствами, равно как – продуктами питания, включая чай, кофе, алкогольные напитки.

Форма выпуска

По 30 мл во флаконы оранжевого стекла с дозатором. Флакон вместе с инструкцией по применению помещается в картонную коробку.

Срок годности

5 лет с момента производства. Не следует использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше +25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Обо всех случаях необычных реакций, связанных с применением препарата, необходимо информировать по электронному адресу представителя заявителя (info.safety@meda-cis.com).

«МЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС ШВЕЙЦАРИЯ ГмбХ», ШВЕЙЦАРИЯ
Хегнауштрассе 60, 8602 Ванген-Брюттисселлен, Швейцария
(«MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH», Switzerland,
Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen-Bruttisellen, Switzerland)

Произведено:
«ЛЕГАСИ ФАРМАСЬЮТИКАЛС ШВЕЙЦАРИЯ ГмбХ», ШВЕЙЦАРИЯ
Рюрбергштрассе, 21, 4127, Бирсфельден, Швейцария
(«Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH», Switzerland,
Ruhrbergstrasse 21, 4127 Birsfelden, Switzerland)

МЕДА

60001128A
562035030CIS00