

ИНСТРУКЦИЯonline-apteka.am

по медицинскому применению препарата

online-apteka.am

КОРВАЛОЛ-ФАРМСТАНДАРТ

online-apteka.am

Регистрационный номер: Р N002312/01

Торговое название препарата: Корвалол-Фармстандарт

Лекарственная форма: капли для приема внутрь.

Состав на 100 мл

Активные вещества:

Этилбромизовалерианат 2,0 г

Фенобарбитал 1,826 г

Мяты перечной масло 0,142 г

Вспомогательные вещества:

Спирт этиловый 95 % (этанол) 79 мл

Натрия гидроксид (натрия гидроокись) 0,022 г

Вода очищенная до 100 мл

Описание:

Прозрачная бесцветная жидкость со специфическим ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство.

Код АТХ: [N05CM].

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат. Фенобарбитал обладает седативным и мягким снотворным эффектами. Способствует снижению возбуждения ЦНС и облегчает наступление сна. Этилбромизовалерианат оказывает седативное и спазмолитическое действие. Масло мяты перечной обладает рефлекторной сосудорасширяющей и спазмолитической активностью.

Показания к применению

Корвалол-Фармстандарт назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы, при неврозоподобных состояниях, сопровождающихся повышенной раздражительностью, нарушенном засыпании, тахикардии, состоянии возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями, а в качестве спазмолитического средства – при спазмах кишечника.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; выраженные нарушения функции почек и /или печени, беременность, период лактации, детский возраст до 3 лет.

online-apteka.am

Способ применения и дозы

Дозировка устанавливается индивидуально. Взрослым назначают обычно по 15-30 капель 3 раза в день до еды. При тахикардии возможно увеличение разовой дозы до 40-50 капель. Детям назначают по 3-15 капель в сутки в зависимости от возраста и клинической картины заболевания.

Детям дошкольного и школьного возраста внутрь по столько капель на прием, сколько лет ребенку по 2-3 раза в день. Детям в возрасте до 3 лет Корвалол-Фармстандарт не назначают.

Длительность применения препарата устанавливается индивидуально врачом.

Побочное действие

Корвалол-Фармстандарт, как правило, хорошо переносится. В отдельных случаях, в дневные часы может наблюдаться сонливость и легкое головокружение, аллергические реакции, снижение концентрации внимания.

При длительном применении больших доз возможно развитие хронического отравления бромом, проявлениями которого бывают депрессивное настроение, апатия, ринит, конъюнктивит, геморрагический диатез, нарушение координации движений, лекарственная зависимость.

Особые указания

Препарат содержит 75 объемных процентов этанола и фенобарбитал, поэтому пациентам, принимающим Корвалол-Фармстандарт, не рекомендуется заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей быстроты психических и двигательных реакций.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

15, 25, 30, 40, 45 или 50 мл во флаконе-капельнице из оранжевого стекла.

Флакон-капельница вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать после даты, указанной на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Наименование и адрес производителя/организация, принимающая претензии

ОАО "Фармстандарт-Лексредства",

305022, Россия, г. Курск,

ул. 2-я Агрегатная, 1а/18,

тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru