

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ViziDol™

капли глазные

Регистрационный номер: 13344 от 17.03.2014

Торговое название: ВизиДол™

Международное непатентованное название – кеторолак.

Лекарственная форма: капли глазные 0,5 %.

Состав: активное вещество – кеторолак трометамин – 5 мг; вспомогательные вещества: натрия хлорид – 7,9 мг; динатрия эдетат – 1 мг; октоксинол 40 – 0,1 мг; бензалкония хлорид – 0,1 мг; натрия гидроксид и/или кислота хлористоводородная до pH 7,4, вода для инъекций – до 1 мл.

Описание: Бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа - нестероидное противовоспалительное средство

Код АТХ: S01BC05

Фармакологическое действие

При местном применении в глаз оказывает выраженное анальгезирующее и умеренное противовоспалительное действие, обусловленное угнетением активности циклооксигеназы - основного фермента метаболизма арахидоновой кислоты. Это приводит к снижению уровня простагландинов во влаге передней камеры глаза, играющих главную роль в патогенезе воспаления и боли. Препарат не влияет на внутриглазное давление. При инстилляциях в глаз системная абсорбция препарата очень низкая.

Показания

Снижение боли и предупреждение воспаления в послеоперационном периоде после удаления катаракты и других хирургических вмешательств на переднем сегменте глаза. Воспалительно-болевого синдром при заболеваниях переднего отдела глаза неинфекционной природы (в том числе хронический неинфекционный конъюнктивит). Снятие покраснения в глазах при сезонном аллергическом конъюнктивите.

Способ применения и дозы

Препарат применяют взрослым и детям старше 12 лет инстилляционно в конъюнктивальный мешок. Перед операцией: по 1 капле 5 раз в течение 3 часов до операции. В послеоперационном периоде: по 1 капле 3 раза в день сразу после операции; далее по 1 капле 4 раза в день в течение необходимого для лечения времени (7-10 дней). При лечении воспалительно-болевого синдрома, для снятия покраснения в глазах при сезонном аллергическом конъюнктивите: по 1 капле 4 раза в день до клинического излечения, но не более 10 дней.

Побочные эффекты

Проходящее жжение и покраснение после инстилляций, аллергические реакции, отек роговицы, кератит поверхностный.

При применении более 14 дней возможно повреждение целостности роговицы: утончение, эрозия, изъязвление и перфорация; синдром "сухого глаза", присоединение глазной инфекции.

При длительном бесконтрольном применении у отдельных пациентов могут наблюдаться системные побочные эффекты - головная боль, головокружение, сонливость, повышение артериального давления.

В случае возникновения любых побочных реакций необходимо обязательно посоветоваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата!

Противопоказания

Повышенная чувствительность к кеторолаку и другим нестероидным противовоспалительным средствам. Кровоизлияния в мозг. Беременность и период кормления грудью. Препарат не рекомендуется назначать детям в возрасте до 12 лет. Не установлена эффективность и безопасность применения препарата у детей до трех лет.

Передозировка

При соблюдении способа применения передозировка невозможна. В случае ухудшения состояния или возникновения аллергических реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Предостережения

Если симптомы заболевания не исчезают, или же наоборот, состояние здоровья ухудшается, или появляются нежелательные явления, необходимо прекратить прием препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения препарата.

Взаимодействие с лекарственными средствами

Если вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом о возможности применения препарата!

В случае необходимости, препарат можно комбинировать с глазными каплями, содержащими антибиотики, бета-блокаторы, ингибиторы карбоангидразы и мидриатики; перерыв между закапываниями должен быть не менее 5 минут. При комбинации со стероидами удлиняется процесс заживления раны.

При одновременном применении с другими нестероидными противовоспалительными средствами, пентоксифиллином, антикоагулянтами возможно увеличение риска послеоперационного кровотечения.

Особые указания

С осторожностью применяют у пациентов с пониженной свертываемостью крови в анамнезе.

При ношении мягких контактных линз необходимо снять линзы за пять минут до инстилляций и надеть через 15 мин после принятия лекарства.

Влияние на способность водить и использовать машины

С осторожностью применять пациентам, у которых после аппликации временно теряется четкость зрения; не рекомендуется водить машину или работать со сложной техникой, станками или каким-либо сложным оборудованием, требующим четкости зрения сразу после закапывания.

Применение в период беременности и кормления грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период кормления грудью.

Условия хранения

При температуре от 15 до 30° С в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. После вскрытия содержимое флакона использовать в течение месяца.

Форма выпуска

Во флаконах-капельницах из полиэтилена по 5 мл.

Условия отпуска

Отпускается по рецепту.

Производитель



ЗАО «Ликвор», Армения
0089, Ереван, Кочиняна 7/9
Тел.: 37460 378800
E-mail: info@liqvor.com