

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Афлубин®

Aflubin®

Регистрационный номер: аптека.ам

П N013116/01

Торговое название препарата:

Афлубин® / Aflubin®

Лекарственная форма:

капли гомеопатические

Состав

В100 мл препарата содержится:

активные компоненты: Gentiana (Генциана)

D1 1 мл, Aconitum

(Аконитум) D6 10 мл, Bryonia (Бриония) D6

10 мл, Ferrum phosphoricum (Феррум фос-

форикум) D12 10 мл, Acidum sarcolacticum

(Ацидум сарколактикум) D12 10 мл; вспомо-

гательные компоненты: спирт этиловый

(этанол)

43 % (по массе) 59 мл.

Описание

Прозрачная от бесцветной до бесцветной со слегка желтоватым оттенком жидкость без специфического запаха.

Фармакотерапевтическая группа:

гомеопатическое лекарственное средство.

Показания к применению

В комплексном лечении гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний с целью облегчения симптомов указанных заболеваний, а также для их профилактики как плановой, так и экстренной; при лечении воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Детский возраст до 2-х лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Для обеспечения наибольшей эффективности Афлубин® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи.

Возраст	Доза (разовая)	Крат- ность приема	Способ применения
1-2 день заболевания ОРЗ или гриппом			
Взрослые и подростки	10 капель	От 3 до 8 раз в день (не более)	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 2 до 12 лет	5 капель		
Дальнейшее лечение клинических проявлений ОРЗ или гриппа			
Взрослые и подростки	10 капель	3 раза в день 5-10 дней	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 2 до 12 лет	5 капель		
Плановая профилактика обострения заболевания в начале холодного времени года или перед эпидемией гриппа			
Взрослые и подростки	10 капель	2 раза в день. 3 недели	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 2 до 12 лет	5 капель		
Экстренная профилактика - проводится сразу же после контакта с заболевшим гриппом или ОРЗ или после сильного переохлаждения			
Взрослые и подростки	10 капель	2 раза в день. 2 дня	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 2 до 12 лет	5 капель		

Лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом

Взрослые и подростки	10 капель	3-8 раз в день в начале лечения (1-2 дня), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца	Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.
Дети от 2 до 12 лет	5 капель		

В начале заболевания, а также случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель каждые полчаса - час до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Редко может отмечаться повышенное слюноотделение. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат не должен применяться пациентами с алкогольной зависимостью. Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Влияние на способность управлять механизмами и автомобилем: в период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

В состав препарата входит спирт этиловый (этанол) - 43% по массе. Афлубин® (Aflubin®) - капли содержит в разовой дозе (10 капель) 0,17 г спирта этилового (этанола). В максимальной суточной дозе (8 раз в день по 10 капель) содержится 1,35 г этилового спирта (этанола).

Форма выпуска

Капли гомеопатические.

По 20 или 50 мл в флаконы из коричневого стекла (тип III) с навинчивающейся крышкой из пропилена с контролем первого вскрытия, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В оригинальной упаковке и защищенном от сильных электромагнитных полей месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Производитель Рихард Биттнер АГ

Юридический адрес: Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия

Адрес места производства: Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Организация, принимающая претензии

потребителей

ООО "Биттнер Фарма"

127018, Москва, ул. Сущевский вал, д. 18,

тел.: +7 (495)981-48-88, факс: +7 (495)981-48-01