

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**КОРСИЗ**  
**(CORSIZ)**

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:**

**международное непатентованное название:** этиловый эфир а-бромизовалериановой кислоты, фенобарбитал, масло мятное;

**основные физико-химические свойства:** таблетки без оболочки, белого или почти белого цвета, с вкраплениями, круглой формы, с плоской поверхностью, с фаской, со специфическим запахом;

**состав:** 1 таблетка без оболочки содержит:

этиловый эфир а-бромизовалериановой кислоты – 8.2 мг; фенобарбитал – 7.5 мг; масло мятное – 0.58 мг;

**вспомогательные вещества:** β-циклодекстрин, картофельный крахмал, таблетоза (лактозы моногидрат), микрокристаллическая целлюлоза, магния стеарат.

**Форма выпуска.**

Таблетки без оболочки.

**Фармакологическая группа.**

Снотворные и седативные средства. ATX-код: N05CB02.

**Фармакологические свойства.**

Корсиз представляет собой седативное, сосудорасширяющее, спазмолитическое средство, которое способствует снижению возбудимости центральной нервной системы. Препарат оказывает успокаивающее действие, облегчает наступление естественного сна. Входящий в состав препарата этиловый эфир а-бромизовалериановой кислоты оказывает седативное и спазмолитическое действие, в больших дозах оказывает также легкий снотворный эффект. Фенобарбитал оказывает седативное и умеренное спазмолитическое действие. Мятое масло оказывает рефлекторный сосудорасширяющий и спазмолитический эффекты.

**Показания к применению.**

Сердечные боли на нервной почве, неврозы с повышенной раздражительностью, психосоматическое беспокойство, страх и нервозность, нарушение засыпания, вегетативные проявления возбуждения.

**Способ применения и дозы.**

Дозировка и длительность курса лечения устанавливаются врачом индивидуально для каждого больного. Взрослым, как правило, назначают по 1-2 таблетки препарата 2-3 раза/сут до еды.

**Побочное действие.**

Корсиз хорошо переносится. В отдельных случаях возможны сонливость в дневное время, головокружение, кожные аллергические реакции, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, при длительном применении – привыкание и лекарственная зависимость. Побочные явления Корсиза легко проходят при снижении дозы или прекращении приема препарата.

При длительном применении больших доз возможно развитие бромизма.

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата, тяжелые нарушения функции печени и почек, печеночная порфирия.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Корсиз усиливает действие седативных препаратов, нейролептиков, транквилизаторов, алкоголя. Действие Корсиза усиливается на фоне применения препаратов валпроевой кислоты. Прием препарата может привести к ослаблению действия производных кумарина, гризофульвина, глюкокортикоидов, пероральных контрацептивов. Препарата повышает токсичность метотрексата.

**Передозировка.**

**Симптомы:** сонливость, слабость, головокружение.

**Лечение:** прекращение приема препарата, промывание желудка, симптоматическая терапия. Корсиз не имеет специфического антидота.

**Беременность и лактация.**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания недопустимо.

**Особенности применения.**

Во время лечения Корсизом применение алкоголя противопоказано.

Препарата содержит лактозу, поэтому пациентам с наследственной непереносимостью лактозы-галактозы применять Корсиз не рекомендуется. Данных о применении Корсиза среди детей не существует, поэтому препарат не применяют в педиатрической практике.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:** В период применения препарата следует воздерживаться от занятий, требующих внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Упаковка.**

10 таблеток в блистере, 10 блистеров в картонной коробке.

**Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

**Срок годности.**

2 года. Препарата не должен применяться по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек.**

Отпускается без рецепта.

**Предприятие-производитель и его адрес:**

ООО "Аверси-Рационал" (Грузия);

Грузия 0198, Тбилиси, ул.Чирнахули, 14.