

# онлайн-аптека.am

## ВЕРАПАМИЛ АЛКАЛОИД

таблетки покрытые оболочкой по 40 мг и 80 мг  
верапамил (verapamil)

### ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Прочитайте внимательно эту инструкцию, прежде чем начать применение препарата!

- Храните эту инструкцию. Вам может понадобиться перечитать ее снова.
- Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.
- Этот препарат предназначен лично Вам, и не следует передавать его другим лицам. Это может нанести вред их здоровью, даже если симптомы их заболевания схожи с теми, которые наблюдаются у Вас.
- Если некоторые побочные действия станут серьезными или заметите побочное действие, которое не указано в этой инструкции, пожалуйста, проинформируйте Вашего врача или фармацевта.

**Инструкция по применению содержит:**

1. Что представляет собой ВЕРАПАМИЛ АЛКАЛОИД и для чего применяется
2. Что необходимо знать до применения препарата ВЕРАПАМИЛ АЛКАЛОИД
3. Как применять ВЕРАПАМИЛ АЛКАЛОИД
4. Возможные побочные действия
5. Хранение и срок годности препарата ВЕРАПАМИЛ АЛКАЛОИД
6. Дополнительные информации

### 1. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЕРАПАМИЛ АЛКАЛОИД И ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

Верапамил Алкалоид содержит верапамила гидрохлорида в качестве активного ингредиента. Принадлежит к группе препаратов, называемых блокаторами кальциевых каналов. Верапамил блокирует поступление кальция в сердечную мышцу и мышцы стенок кровеносных сосудов, которым кальций необходим для сокращения и растяжения. Таким образом, Верапамил Алкалоид:

- предотвращает или ослабляет стенокардию (боль в груди, шее или руке, связанные с физической нагрузкой или стрессом);
- помогает в лечении нерегулярного сердцебиения, его замедлением;
- помогает в снижении высокого артериального давления (гипертензии).

### 2. ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ВЕРАПАМИЛ АЛКАЛОИД

**Не принимайте Верапамил Алкалоид, если:**

- у Вас гиперчувствительность (аллергия) к верапамилу или любому из других компонентов препарата;
- Вы недавно перенесли сердечный приступ;
- у Вас блокада сердца;
- у Вас очень медленное или нерегулярное сердцебиение;
- Вы уже принимаете внутривенно бета-блокаторы, для снижения артериального давления;
- у Вас состояние, которое называется Вольф-Паркинсон-Уайт синдром;
- Вы беременны.

**Будьте особенно осторожны с препаратом Верапамил Алкалоид если у Вас:**

- низкое артериальное давление или замедленное сердцебиение;
- сердечная недостаточность или страдаете от одышки и отека лодыжек;

- заболевание печени или почек;
- мышечная дистрофия.

**Применение с другими лекарственными средствами**

Посоветуйтесь, пожалуйста, с врачом или фармацевтом о всех лекарственных средствах, которые принимаете в настоящее время или принимали недавно, в том числе и те, которые отпускаются без рецепта, лекарственные препараты растительного происхождения или любого из следующих препаратов:

- Препараты для снижения артериального давления, называемые бета-блокаторы, например, атенолол, метопролол, пропранолол;
- празозин и terazозин, для снижения артериального давления или лечения проблем с простатой;
- флекаинид и хинидин, для лечения нерегулярных сердечных сокращений;
- теофиллин, при затрудненном дыхании;
- препараты для лечения эпилепсии, например, фенобарбитал, карбамазепин;
- имипрамин, для лечения депрессии;
- глибурид, для лечения высокого уровня сахара в крови;
- препараты для лечения подагры, например, колхицин, сульфинпиразон;
- препараты для лечения инфекций, например, эритромицин, рифампицин, телитромицин;
- доксорубицин, для лечения рака;
- препараты для лечения тревоги, например, буспирон, мидазолам;
- дигоксин, для лечения заболеваний сердца;
- циметидин, для лечения изжоги или язвы;
- препараты для контроля иммунной реакции организма, например, циклоспорин, эверолимус, сиролимус, такролимус;
- препараты для снижения холестерина, например, симвастатин, ловастатин, аторвастатин;
- алмотриптан, для лечения мигрени;
- зверобой, для лечения депрессии;
- противовирусные препараты, например, ритонавир;
- литий, для лечения психических заболеваний;
- препараты, применяемые для расслабления мышц;
- аспирин, для смягчения боли и воспаления.

Проконсультируйтесь с врачом перед началом приема любых других препаратов.

### Применение Верапамила Алкалоид с пищей и напитками

Не принимайте Верапамил Алкалоид одновременно с грейпфрутовым соком, так как может изменить эффект препарата.

Не следует употреблять алкоголь во время лечения препаратом, так как возможно усиление побочных эффектов Верапамила Алкалоид.

### Беременность и кормление грудью

Не принимайте Верапамил Алкалоид не посоветавшись с врачом, если Вы беременны или кормите грудью.

Посоветуйтесь с своим врачом или фармацевтом до начала приема любого лекарственного средства.

### Вождение автотранспорта и управление механизмами

Не следует водить автомобиль или управлять механизмами, если Верапамил Алкалоид влияет на Вашу способность выполнения этих задач.

### Важная информация о некоторых ингредиентах препарата Верапамил Алкалоид

Препарат содержит лактозу моногидрат. Если Вам известно, что у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу за советом, прежде чем начать прием этого препарата.

### 3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ВЕРАПАМИЛ АЛКАЛОИД

Всегда принимайте Верапамил Алкалоид согласно предписаниям Вашего врача. Если Вы не уверены в чем-то, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом.

Таблетки следует принимать с пищей или вскоре после приема пищи, запивая водой. Не следует принимать с грейпфрутовым соком.



Дозу Верапамила Алкалоид определяют в зависимости от состояния, подлежащего лечению. Обычные дозы составляют:

#### Взрослые

**Стенокардия, в том числе стенокардия Принцметала:**  
Обычная доза составляет 120 мг 3 – 4 раза в сутки. Некоторым пациентам достаточно сниженная доза – 80 мг 3 раза в сутки.

**Нерегулярное сердцебиение или ритм сердца:**  
Обычная доза составляет 40 мг до 120 мг 3 – 4 раза в сутки, в зависимости от тяжести состояния.

**Гипертензия (высокое артериальное давление):**  
Обычная доза составляет 40 мг до 120 мг 3 – 4 раза в сутки. При длительном лечении суточная доза не должна превышать 480 мг.

Если у Вас впечатление, что эффект Верапамила Алкалоид слишком сильный или слабый, поговорите со своим врачом или фармацевтом.

#### Дети (в возрасте 2 года и старше)

Только для лечения нарушений сердцебиения:  
Обычная доза составляет 40 – 120 мг, 2 – 3 раза в сутки, в зависимости от возраста и эффективности. Дозу определяет врач.

Если Вы приняли больше Верапамил Алкалоид, чем необходимо (в случае передозировки) немедленно обратитесь к врачу!

Если Вы забыли принять препарат Верапамил Алкалоид, примите пропущенную дозу сразу, как только установите упущение. Если все таки пришло время приема следующей дозы, пропустите упущенную и продолжайте прием по установленной схеме. Не принимайте двойную дозу, чтобы возместить пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применять препарат Верапамил Алкалоид

Не прекращайте прием препарата не посоветавшись с врачом.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы относительно применения данного препарата, обратитесь к врачу или фармацевту.

#### **4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

Как и все лекарственные средства Верапамил Алкалоид может вызвать побочные действия, которые не встречаются у всех пациентов.

Побочные эффекты включают:

- Запор;
- тошнота и плохое самочувствие;
- боль в животе или дискомфорт;
- чувство усталости или головокружение;
- тремор;
- звон в ушах;
- невольные, нерегулярные движения мышц;
- беспокойство;
- выпадение волос;
- покалывание;
- болезненное чувство жжение в конечностях;
- мышечная слабость;
- боль в мышцах и суставах;
- румянец;
- головная боль;
- отеки лодыжек;
- пожелтение кожи или белков глаз;
- темная моча и бледный стул;
- импотенция;
- необычные выделения грудного молока.

Иногда, Верапамил Алкалоид может привести к значительному падению артериального давления, замедленному или ускоренному и нерегулярному сердцебиению. Также может привести к одышке и отеку стоп или ног. В том случае следует обратиться врачу.

Если у Вас заболевание сердца и чувствуете, что симптомы обостряются, обратитесь к своему врачу.

Могут произойти аллергические реакции, такие как зуд и покраснение кожи. Также возможно возникновение

серьезных аллергических реакций, которые вызывают отек лица или горла, тяжелые кожные реакции, образование волдырей на коже, полости рта, глаз и половых органов. Также может произойти набухание десен или увеличение молочных желез у мужчин, которые исчезают после прекращения лечения.

Если некоторые побочные действия станут серьезными или заметите побочное действие, которое не указано в этой инструкции, пожалуйста, проинформируйте Вашего врача или фармацевта.

#### **5. ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ ПРЕПАРАТА**

Хранить при температуре не выше 25°C.  
Хранить в недоступном для детей месте!

Не использовать препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности продолжается до последнего дня указанного на упаковке месяца.

Лекарственные средства нельзя выбрасывать в сточные воды и мусор.

Проконсультируйтесь с фармацевтом, как утилизировать лекарственные средства, которые Вам не нужны. Данные меры помогут в защите окружающей среды.

#### **6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ**

Что содержит Верапамил Алкалоид

**Активное вещество:** верапамила гидрохлорид.

Одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит верапамила гидрохлорида 40 мг или 80 мг.

**Вспомогательные вещества:** лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, натрия крахмалгликолят, тальк, магния стеарат, гидроксипропилцеллюлоза; оболочка: сахароза, титана диоксид, повидон, макроголь 6000, акация, тальк, краситель Е 104, опаглос белый 6000.

**Описание лекарственного средства Верапамил Алкалоид и содержимое упаковки**

Блестящие, двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой желтого цвета.

По 15 таблеток в блистере; по 2 блистера в картонной коробке вместе с инструкцией по применению препарата.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускают по рецепту.

**Держатель регистрационного удостоверения и производитель**

Алкалоид АД – Скопье

бул. Александар Македонски 12

1000 Скопье, Республика Македония

тел. + 389 2 31 04 000

факс: + 389 2 31 04 021

[www.alkaloid.com.mk](http://www.alkaloid.com.mk)

**Дата последнего пересмотра**

Май, 2011