

Беременность, кормление грудью и фертильность

Желательно не принимать Лодигрел® во время беременности и кормления грудью.

Если вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что беременны, или планируете иметь ребёнка, вам следует сообщить об этом врачу или фармацевту до начала приема этого препарата. Если беременность наступит во время приема препарата Лодигрел®, немедленно посоветуйтесь с врачом, поскольку рекомендуется воздерживаться от применения клопидогрела во время беременности.

Не следует кормить грудью во время приема этого препарата.

Если вы кормите грудью или планируете грудное вскармливание, проконсультируйтесь с вашим врачом прежде, чем начать приём этого препарата.

Посоветуйтесь с врачом или фармацевтом до приема любых лекарственных средств.

Управление транспортными средствами и механизмами

Маловероятно, что Лодигрел® может влиять на способность управлять транспортными средствами или механизмами.

Лодигрел® содержит гидрогенизированное касторовое масло, которое может вызвать расстройство желудка или диарею.

3. Как следует принимать Лодигрел®

Всегда принимайте этот препарат строго по назначению врача. Если вы не уверены, обязательно посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

Если у вас была сильная боль в груди (нестабильная стенокардия или сердечный приступ), врач может назначить вам 300 мг препарата Лодигрел® (4 таблетки по 75 мг) однократно в начале курса лечения. Затем вы будете принимать обычную дозу – по одной таблетке 75 мг в день внутрь независимо от приема пищи, каждый день в одно и то же время.

Вы должны принимать Лодигрел® в течение назначенного врачом периода времени.

Если вы приняли слишком много препарата Лодигрел®

Обратитесь к врачу или в ближайшее отделение неотложной помощи в связи с повышенным риском кровотечения.

Если вы забыли принять Лодигрел®

Если вы забыли принять дозу препарата Лодигрел®, но вспомнили об этом в течение 12 часов после обычного времени приема, немедленно примите таблетку, а затем примите следующую таблетку в обычное время.

Если вы пропустили более 12 часов, просто примите следующую таблетку в обычное время. Не принимайте удвоенную дозу для возмещения пропущенных доз.

Если вы прекратили прием препарата Лодигрел®

Прекращение приема препарата недопустимо без соответствующего указания врача. До прекращения приема этого препарата обратитесь к врачу или фармацевту.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о применении этого препарата, обращайтесь к врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные реакции при медицинском применении

Как и все другие лекарственные препараты, данный препарат также может вызвать побочные реакции, однако они возникают не у всех пациентов.

Классификация побочных реакций по частоте их развития:

- Очень частые: имеют место в 1 случае из 10 назначений
- Частые: имеют место в 1 случае из 100 назначений
- Нечастые: имеют место в 1 случае из 1 000 назначений
- Редкие: имеют место в 1 случае из 10 000 назначений
- Очень редкие: имеют место менее, чем в 1 случае из 10 000 назначений

При возникновении следующих симптомов немедленно обратитесь к врачу:

- лихорадка, признаки инфекции или чрезвычайная утомляемость: они могут быть следствием редкого снижения количества некоторых клеток крови;
- признаки нарушений функции печени, например, пожелтение кожи и/или белков глаз (желтуха) при наличии или отсутствии подкожных кровоизлияний (в виде мелких красных точек) и/или спутанного состояния сознания (см. раздел «Меры предосторожности при медицинском применении»);
- отек слизистой оболочки рта, изменения кожи, например, сыпь и зуд, пузыри на коже – это может быть признаками аллергической реакции.

Самым частым побочным эффектом (наблюдается у 1-10 пациентов из 100) препарата Лодигрел® является кровотечение.

Кровотечение может проявиться истечением крови из желудка или кишечника, образованием синяков, гематом (необычные кровоизлияния или синяки под кожей), носовым кровотечением, появлением крови в моче.

В редких случаях описано кровоизлияние в глаз, внутричерепное кровоизлияние, легочное или внутрисуставное кровотечение.

Если у вас возникло длительное кровотечение во время приема препарата Лодигрел®

Если вы порезались или поранились, остановка кровотечения может занять больше времени, чем обычно. Это связано с механизмом действия принимаемого вами препарата, который предотвращает свертывание крови. При небольших порезах или повреждениях, например, во время бритья, это обычно не опасно. Однако если кровотечение вас тревожит, немедленно обратитесь к врачу (см. раздел «Меры предосторожности при медицинском применении»).

Другие возможные побочные эффекты препарата Лодигрел® перечислены ниже

Частые побочные эффекты (наблюдаются у 1-10 пациентов из 100): диарея, боль в животе, несварение, изжога.

Нечастые побочные эффекты (наблюдаются у 1-10 пациентов из 1 000): головная боль, язва желудка, рвота, тошнота, запор, скопление газа в желудке или кишечнике, сыпь, зуд, головокружение, изменение чувствительности прикосновения.

Редкие побочные эффекты (наблюдаются у 1-10 пациентов из 10 000): системное головокружение.

Очень редкие побочные эффекты (менее чем у 1 из 10 000 пациентов): желтуха, сильная боль в животе с болью в спине или без нее, лихорадка, затрудненное дыхание, иногда с кашлем, общие аллергические реакции, отек слизистой оболочка рта, пузыри на коже, кожная аллергия, воспаление слизистой оболочки рта (стоматит), снижение артериального давления, спутанное сознание, галлюцинации, боль в суставах, боль в мышцах, нарушение вкусовых ощущений.

Кроме того, врач может выявить изменения результатов анализов в крови или моче.

При обнаружении любых побочных эффектов или возникновении эффектов, не упомянутых в данной инструкции, обратитесь к врачу или фармацевту.

5. Как следует хранить Лодигрел®

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить препарат в недоступном для детей месте.

Не принимать Лодигрел® после даты окончания срока хранения, указанной на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Лекарственные средства не следует выбрасывать в бытовые отходы или сточные воды. Если необходимо удалить в отходы препарат, который больше не нужен, проконсультируйтесь с фармацевтом. Эти меры помогут предотвратить загрязнение окружающей среды.

6. Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту врача.

7. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит препарат Лодигрел®

Активным веществом этого препарата является клопидогрел. Каждая таблетка содержит 75 мг клопидогрела (в виде клопидогрела гидросульфата).

Другие компоненты:

ядро таблетки: целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, гидроксипропилцеллюлоза с низкой степенью замещения, масло касторовое гидрированное; оболочка: Опадри Y-1-7000 белый (гипромеллоза E464, титана диоксид E171, макрогол 400).

Как выглядит Лодигрел® и что содержится в упаковке

Препарат Лодигрел® по 75 мг в таблетках, покрытых оболочкой – это белые или почти белые круглые двояковыпуклые таблетки покрытые оболочкой, с гладкой и однородной поверхностью, без или почти без запаха.

Гравировка на одной стороне таблетки: «E 181».

Форма выпуска: по 7 таблеток, покрытых оболочкой в блистер. 2 или 4 блистера помещены в картонную пачку с инструкцией по применению.

Высвобожденная торговая лицензия и производитель

ЗАО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС»
1106 БУДАПЕШТ, ул. Керестури, 30-38
ВЕНГРИЯ

Производственная площадка:

ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС»
1165 Будапешт, ул. Бекенфельди, 118-120
Венгрия

EGIS Doc. No.: 30976/0