

УТВЕРЖДЕНО
Фармакологическим Советом Министерства
здравоохранения Республики Армения
19.12.2012 г

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ (Информация для потребителей)

АНТИ-КОЛД Таблетки для приема внутрь

Регистрационное свидетельство №12102

Торговое название препарата – Анти-Колд

Международное (генерическое) название – Парацетамол
(Paracetamol), Фенилэфрина гидрохлорид (Phenylephrine hydrochloride), Хлорфенирамина малаеат (Chlorpheniramine maleate)

Общая характеристика

Основные физико-химические свойства

Круглые с плоской торцовой поверхностью таблетки белого цвета с риской на одной стороне и фаской с двух сторон.

Состав

Одна таблетка содержит:

активные вещества: парацетамол - 325 мг, фенилэфрина гидрохлорид 5 мг, хлорфенирамина малаеат - 2мг .

вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, лактоза моногидратная, повидон, магния стеарат, натрия крахмала гликолат.

Фармакологическая группа и код ATХ

Аналгетик, антипиредик, антагонист гистаминовых H1-рецепторов, симпатомиметик. Код ATХ - R05X

Фармакологическое действие

Анти-Колд обладает болеутоляющим, жаропонижающим, противоаллергическим и сосудосуживающим (вызывает сужение артериол) действием.

Парацетамол оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и слабовыраженное противовоспалительное действие. Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов и влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе.

Хлорфенирамина малаеат оказывает антиаллергическое действие (устраняет слезотечение, зуд в носу и в глазах).

Фенилэфрина гидрохлорид оказывает сосудосуживающее влияние, преимущественно по отношению к сосудам верхних дыхательных путей (уменьшает повышенное слизеобразование и отек слизистой носа).

Когда применять Анти-Колд?

Анти-Колд можно применять для симптоматического лечения гриппа и простуды, сопровождающихся:

-высокой температурой,

-лихорадкой и ознобом,

-мышечной и головной болью,

-острым ринитом,

-насморком и заложенностью носа,

-чиханием.

Как принимать Анти-Колд?

Детям от 2 до 6 лет режим дозирования устанавливает врач.

-Детям от 6 до 12 лет – разовая доза - 1 таблетка.

-Взрослым и детям старше 12 лет - разовая доза - 2 таблетки.

-Рекомендуемую разовую дозу при необходимости можно повторить каждые 4-6 ч, но не более 4 раз/сут.

-Продолжительность приема: для симптоматического лечения лихорадки – не более 3-х дней, боли – не более 5 дней.

Какие нежелательные эффекты могут проявляться при применении препарата?

В редких случаях возможны сыпь, зуд, чувство усталости, головокружение, нарушение сна; нарушения зрения; сухость во рту, тошнота, рвота, боли в эпигастральной области, которые проходят при отмене препарата.

В каких случаях нельзя принимать препарат?

Не следует принимать Анти-Колд, если у Вас раньше отмечалась повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Анти-Колд противопоказан детям в возрасте до 2 лет.

Нужно сообщить врачу, если у Вас:

- хронический бронхит,
- эмфизема,
- закрытоугольная глаукома,
- заболевания сердца,
- артериальная гипертония,
- выраженный атеросклероз,
- заболевания щитовидной железы,
- сахарный диабет,
- гипертрофия предстательной железы.

Нужно отменить прием препарата или обратиться к врачу, если:

-ваше состояние не улучшается или появляются новые симптомы заболевания (следует иметь в виду возможность более серьезного заболевания).

Об этом нужно знать!

Не рекомендуется назначать **Анти-Колд** в период беременности. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о временном прекращении грудного вскармливания.

С осторожностью назначают пожилым, лицам с заболеваниями печени, а также нельзя принимать препарат длительное время (для лечения лихорадки – не более 3-х дней, боли – не более 5 дней), так как повышается риск развития побочных эффектов, вызванных каждым из активных ингредиентов.

Одновременно с препаратом **Анти-Колд** не рекомендуется принимать другие препараты, содержащие ацетаминофен (парацетамол) и другие противопростудные препараты.

Применение препарата **Анти-Колд** возможно не ранее, чем через 14 дней после окончания приема ингибиторов МАО (изокарбоксазид, фенелзин, транилципромин).

Нельзя принимать **Анти-Колд** одновременно с препаратами седативного действия (транквилизаторами, трициклическими антидепрессантами, противоаллергическими, противосудорожными, мышечными релаксантами, алкоголем), так как повышается риск развития побочных эффектов этих лекарств, особенно сонливость.

Одновременно с препаратом **Анти-Колд** не рекомендуется принимать бета-адреноблокаторы.

Нужно обязательно сообщить врачу, если Вы принимаете другие лекарства.

Какие симптомы могут быть при передозировке?

Симптомы: тошнота, рвота, боли в эпигастральной области; в тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность, энцефалопатия и коматозное состояние.

Лечение: симптоматическое. В начале рекомендуется промывание желудка, прием активированного угля.

В каких условиях нужно хранить препарат?

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре 15-25°C.

Сроки хранения

Срок годности 4 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта.

online-apteka.am

Форма выпуска и упаковка

Картонная упаковка, содержащая 20 таблеток (2 блистера по 10 таблеток).

Производитель

ООО "АРПИМЕД"

Республика Армения, Котайки марз, г. Абовян, 2-ой мкр, дом 19
Тел.: 374 (222) 21703, 21740 Факс: 374 (222) 21924