

online-apteka.am

# ДИП ХИТ



online-apteka.am

online-apteka.am

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** ДИП ХИТ

**Лекарственная форма:** крем для наружного применения

**Описание:** крем белого цвета с запахом ментола и метилсалицилата.

**Состав:** 1,0 г крема содержит:

**Действующие вещества:**

Метилсалицилат 128,0 мг  
Ментол (рацемический) 59,1 мг  
Эвкалипта листьев масло 19,7 мг  
Терпентинное масло 14,7 мг

**Вспомогательные вещества**

Вода очищенная	552,5 мг
Спирт цетостеариловый	180,0 мг
Натрия цетостеарилсульфат	20,0 мг
Парафин жидкий	10,0 мг
Пропиленгликоль	10,0 мг
Ланолин	5,0 мг
Довицил 200	1,0 мг

**Фармакологическая группа:**

Лекарственные средства для местного применения, используемые при мышечной и суставной боли.  
Лекарственные средства, содержащие производные салициловой кислоты.

**Код АТХ: М02АС.**

**Фармакологические свойства.**

Метилсалицилат является производным салициловой кислоты, которая применяется для облегчения боли. Терпентинное масло и масло эвкалипта действуют как раздражающие средства. Ментол при местном применении способствует развитию обезболивающего эффекта. Лекарственное средство предназначено для местного применения, фармакокинетические исследования не проводились.

**Показания к применению.**

Для симптоматического лечения боли в мышцах и мышечного напряжения, включая люмбаго, ишиас, фиброзные воспаления, боли после ушибов и растяжения связок (в том числе легкие спортивные травмы). Применяется в комплексном лечении болевого синдрома при ревматизме.

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период кормления грудью. Повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте, ибuproфену или к нестероидным противовоспалительным средствам, особенно при наличии бронхиальной астмы в анамнезе. Не применять у детей в возрасте до 18 лет. Нарушение целостности кожных покровов.

## **Способ применения и дозы.**

Только для наружного применения.

Назначают для взрослых старше 18 лет.

Рекомендуется наносить крем 2-3 раза в день на пораженный участок или болезненную область и легко втирать.

Продолжительность лечения определяется врачом и зависит от тяжести и течения заболевания.

Может использоваться до и после физических упражнений.

## **Побочное действие.**

Возможны кожные аллергические реакции: покраснение, ощущение жжения, сыпь.

## **Передозировка.**

Не описано. При местном применении передозировка маловероятна. Не исключается развитие передозировки при нанесении на большие участки кожи или при случайном проглатывании большого количества препарата. В этом случае необходимо проводить симптоматическую терапию.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами.**

Метилсалицилат усиливает эффект антикоагулянтов, метотрексата при абсорбции, что следует учитывать при использовании больших доз препарата длительное время. Необходимо медицинское наблюдение за пациентами, принимающими антикоагулянтные лекарственные средства кумаринового типа и применяющими крем ДИП ХИТ.

Перед применением препарата ДИП ХИТ следует проконсультироваться с врачом, если Вы используете какие-либо другие препараты.

## **Особые указания.**

Только для наружного применения. Нельзя наносить крем на губы, ноздри, участки вокруг глаз, половых органов и анального отверстия, а также на поврежденную или раздраженную кожу. В случае попадания крема на вышеуказанные участки немедленно смойте препарат большим количеством чистой воды.

Следует избегать контакта крема с глазами и попадания его в дыхательные пути. При попадании препарата Дип Хит на слизистую оболочку глаз, глаза следует промыть водой.

При случайном проглатывании препарата следует обратиться к врачу или в ближайший пункт неотложной помощи.

После применения препарата Дип Хит всегда следует мыть руки, если только они не являются объектом лечения.

Перед использованием попробуйте крем на небольшом участке кожи.

Некоторые пациенты могут испытывать дискомфорт, особенно при индивидуальной повышенной чувствительности кожи, при применении крема в жаркую погоду или сразу после ванны.

Немедленно прекратите применение крема в случае возникновения раздражения на коже или других побочных реакций.

Крем содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

Крем содержит ланolin и цетостеариловый спирт, которые могут вызывать развитие местных реакций кожи (например, контактный дерматит).

## **Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами.**

Информация отсутствует.

## **Форма выпуска.**

Крем для наружного применения.

По 15 г, 67 г в тубах алюминиевых.

Каждая туба вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

## **Условия хранения.**

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 3 года. Препарат не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек.** Без рецепта врача.

**Производитель.** Ментолатум Компани Лимитед/The Mentholatum Company Limited.

Адрес: 1 Редвуд Авеню, Пил Парк Кампус, Ист Килбрид G74 5PE, Шотландия, Великобритания / 1 Redwood Avenue, Peel Park Campus, East Kilbride, Scotland, UK



**Mentholatum**