

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

online-apteka.am

Граммидин®

нео

online-apteka.am

С АНЕСТЕТИКОМ

Регистрационный номер: ЛСР – 005119/08

Торговое название препарата: ГРАММИДИН® с анестетиком нео

Группировочное название: Грамицидин С + Оксibuпрокаин + Цетилпиридиния хлорид

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав:

Одна таблетка содержит:

активные вещества:

грамицидина С дигидрохлорид – 3,20 мг (в пересчете на грамицидин С – 3,00 мг);

оксibuпрокаина гидрохлорид – 0,20 мг;

цетилпиридиния хлорида моногидрат – 1,05 мг (в пересчете на цетилпиридиния хлорид – 1,00 мг);

вспомогательные вещества:

кремния диоксид коллоидный – 5,00 мг, тальк – 60,00 мг, ацесульфам калия – 15,00 мг, ароматизатор мятный – 25,00 мг, сорбитол – 1065,55 мг, магния стеарат – 25,00 мг.

Описание: таблетки белого цвета круглые двояковыпуклые с надписью на одной стороне GR.

Фармакотерапевтическая группа: антибиотик + антисептическое средство + местноанестезирующее средство.

Код АТХ: R02A

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний горла и полости рта. В состав препарата входит противомикробное средство грамицидин С, местноанестезирующее (обезболивающее) средство - оксibuпрокаин и антисептическое средство - цетилпиридиния хлорид.

Механизм действия грамицидина С связан с повышением проницаемости цитоплазматической мембраны микробной клетки, что нарушает ее устойчивость и вызывает гибель клетки.

Грамицидин С оказывает выраженное противомикробное действие в отношении возбудителей инфекционных заболеваний полости рта и глотки.

Анестетик оксibuпрокаин оказывает местное обезболивающее действие на слизистую оболочку полости рта и горла. Вызывает обратимую блокаду распространения и проведения нервных импульсов через аксоны нервных клеток.

Цетилпиридиния хлорид относится к антисептическим средствам. Подавляет рост и размножение возбудителей инфекционных заболеваний полости рта.

Препарат оказывает обезболивающий эффект, уменьшает воспаление, оказывает противомикробное действие, смягчает неприятные ощущения в горле, облегчает глотание, при рассасывании вызывает гиперсаливацию, что способствует

механическому очищению полости рта и глотки от микроорганизмов.

Фармакокинетика

Препарат обладает местным действием и практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, что определяет практически полное отсутствие системных эффектов.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и горла: ангина, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, гингивит, стоматит.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам, входящим в состав препарата;
- детский возраст до 4 лет;
- беременность (I триместр).

Применение при беременности и в период лактации

Не рекомендуется применять препарат при беременности (I) триместр.

Грудное вскармливание на время приема препарата необходимо прекратить.

Способ применения и дозы

Применяется после еды, путем рассасывания во рту не разжевывая.

Непосредственно после применения препарата следует воздержаться от приема пищи и напитков в течение 1-2 часов.

Дозировка для взрослых и детей старше 12 лет: по 1 таблетке 3-4 раза в день.

Дозировка для детей от 4 до 12 лет: по 1 таблетке 1-2 раза в день.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней приема препарата рекомендуется обращение к врачу.

Побочное действие

В отдельных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата, временная потеря чувствительности языка.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Граммидин® с анестетиком нео усиливает эффекты других противомикробных средств местного и системного действия.

Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания.

По 6 или 9 таблеток в контурную ячейковую упаковку или в контурную ячейковую упаковку с перфорацией из пленки поливинилхлоридной или пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной или комбинированного материала (полиамид/алюминий/поливинилхлорид) и фольги алюминиевой.

2, 3 или 4 контурные упаковки по 6 таблеток или 2 контурные упаковки по 9 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года. Не применять после истечения срока годности

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Претензии от покупателей принимает предприятие-изготовитель:

ОАО «Валента Фармацевтика»,

141101, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Фабричная, 2.

Тел. (495) 933-48-62, факс (495) 933-48-63