

**ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ**

(информация для пациентов)  
по применению

**лекарственного средства  
ДИКЛОФЕНАК НАТРИЯ****Торговое название:**

Диклофенак натрия.

**Международное непатентованное название:**

Диклофенак/Diclofenac\*.

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения 10 мг/г.

**Состав:** одна туба (30 г мази) содержит

действующее вещество - диклофенак натрия – 0,3 г,

вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, макрогол 1500, макрогол 400.

**Описание:** мазь белого или почти белого цвета, со слабым специфическим запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства. Производные уксусной кислоты и родственные соединения. Код АТХ: M01AB05.

**Показания к применению**

Травматически обусловленные воспаления сухожилий, связок, мышц и суставов (вследствие растяжений, при нагрузке и ушибах).

Локализованные формы ревматизма мягких тканей, такие как синдром «плечо-кость», тендовагинит, бурсит, периартропатия.

Локализованные ревматические заболевания, например, артроз суставов.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к Диклофенаку натрия или другим

компонентам лекарственного средства, ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП, "аспириновая" астма, беременность (III триместр), период лактации, детский возраст (до 12 лет), нарушение целостности кожных покровов.

**С осторожностью**

Печеночная порфирия (обострение), эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, тяжелые нарушения функции печени и почек, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма, пожилой возраст, беременность I и II триместр.

**Способ применения и дозы**

Наружно, 2 - 4 г мази (что по объему сопоставимо соответственно с размером вишни или грецкого ореха и достаточно для обработки площади поверхности тела 400-800 см<sup>2</sup>) наносят тонким слоем, слегка втирая в кожу над очагом воспаления, 2 - 3 раза в сутки. После нанесения мази руки необходимо вымыть, если они не являются областью лечения (при артрозах пальцев рук). Максимальная суточная доза - 8 г. Длительность лечения зависит от показаний и отмечаемого эффекта (для усиления эффекта мазь можно применять вместе с другими лекарственными формами диклофенака). Необходимо проконсультироваться с врачом после 2-х недель использования лекарственного средства.

**Побочное действие**

Со стороны кожных покровов: экзема, фотосенсибилизация, контактный дерматит (зуд, гиперемия, отечность обрабатываемого участка кожи, папулезно-везикулезные высыпания, шелушение).

Аллергические реакции: (зуд и жжение кожи, эритематозная кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, системные анафилактические реакции (включая шок).

### **Особые указания**

Наносят только на неповрежденные участки кожи, после нанесения не следует накладывать окклюзионную повязку.

При длительном применении и/или нанесении на обширные поверхности кожи повышается риск развития системных побочных эффектов, в т.ч. может наблюдаться повышение активности печеночных ферментов. Для минимизации возможного риска развития побочных реакций со стороны печени Диклофенак натрия следует использовать в минимально эффективной дозе в минимально короткий период.

Следует избегать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки или открытые раны.

Применять только наружно.

### **Применение во время беременности**

Не существует контролируемых клинических исследований у беременных женщин, поэтому Диклофенак натрия не должен применяться во время беременности. Применение особенно опасно в III триместре беременности из-за возможного досрочного закрытия боталлового протока и вероятности подавления родовых схваток.

### **Применение в период грудного вскармливания**

Нет данных о проникновении в грудное молоко Диклофенака натрия, применяемого местно. Поэтому лекарственное средство не должно применяться у кормящих

женщин. При веских причинах назначения лекарственное средство не должно наноситься на область груди, нельзя им обрабатывать обширные участки поверхности и использовать продолжительное время.

### **Передозировка**

Ввиду низкой системной абсорбции при аппликации мази, передозировка маловероятна.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Может усиливать действие лекарственных средств, вызывающих фото-сенсibilизацию.

С осторожностью использовать с другими лекарственными средствами, обладающими заведомо известной гепатотоксичностью, например, антибиотиками, противосудорожными средствами.

Клинически значимое взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно, вследствие незначительной системной абсорбции.

### **Упаковка**

По 30 г в тубах в упаковке № 1.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не использовать после окончания срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Производитель**

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, г. Борисов Минской обл., ул. Чапаева 64, тел/факс +375(177)735612.