

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препарат компоненттерінің кез-келгеніне жекелей жоғары сезімталдық
- 13 жасқа дейінгі балалар.

Дәрілермен өзара әрекеттесуі

Новокаинмен, тыныштандыратын препараттармен бір мезгілде қолдану ұсынылмайды.

Айрықша нұсқаулар

Ангиновагтың құрамында ақырғы көлемі 89,385 % этанол бар. Әр бүрку шамамен 0.075 г этанолдан тұрады, ол педиатрияда 13 жасқа дейінгілер, жүкті әйелдер мен бауыр аурулары, маскүнемдігі, эпилепсиясы, ми зақымдалулары бар емделушілерде қолданылуындағы қауіпке себеп болады, сондықтан сақтықпен қолдану керек. Қант диабетінде сақ болу керек, өйткені препараттың құрамында натрий сахаринаты бар.

Жүктілік және лактация кезеңі

Препаратты жүктілік және лактация кезеңінде қолдануға қарсы көрсетілім жоқ, бірақ қабылдаудың дұрыстығын қолданудың ықтимал қаупінен пайдасының басымдығына байланысты дәрігер анықтайды. Ұсынылған дозаларынан асырмау керек. *Автокөлік немесе қауіптілігі зор басқа механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері* Құрамында 0.075 г этанол бар екенін ескере отырып, автокөлік немесе қауіптілігі зор басқа механизмдерді басқару кезінде сақ болу қажет.

Артық дозалануы

Артық дозаланған жағдайлары тіркелмеген.

Шығарылу түрі мен қаптамасы

20 мл препараттан полипропилен қақпақпен тығындалған, тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған ақ түсті құтыларға салады.

1 құтыдан қондырмасымен және медицинада қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс

тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон пәшкеге салады.

Сақтау шарттары

30°C-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

4 жыл

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецептісіз

Өндіруші ұйымның атауы мен елі

Феррер Интернациональ С.А.,
Гран Виа де Карлос III, 94 08028 Барселона,
Испания.

Тіркеу куәлігі иесінің атауы мен елі

Лаборатории Новаг С. А., Испания


Қаптаушы ұйымның атауы мен елі

Феррер Интернациональ С.А., Испания.

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім (тауар) сапасына қатысты шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы

Өкілдігі: Орта Азия бойынша ҚР-дағы «Медиал Ди энд Пи Лтд»

Мекенжайы: 050050, Алматы қ-сы, тел: +7 727 295 48 82/83, факс 295 48 81.



УТВЕРЖДЕНА

приказом председателя
Комитета контроля медицинской и
фармацевтической деятельности

Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

от « 21 » 11 2012 г.

№ 896.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Ангиноваг

Торговое название

Ангиноваг

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Спрей для местного применения

Состав

100 мл препарата содержат

активные вещества:

деквалиния хлорид 0.1 г, тиротрицин 0.4 г,

β-глицирретовая кислота 0.06 г, гидрокортизона

ацетат 0.06 г, лидокаина гидрохлорид 0.1 г,

вспомогательные вещества:

пропиленгликоль, масло ананасовое, натрия сахаринат, этанол 96 %.

Описание

Прозрачный, бесцветный или светло-желтый раствор с характерным вкусом и запахом ананаса.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы. Препараты для лечения заболеваний горла.

Код АТХ R02A.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Препарат предназначен для ингаляционного применения и образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления.

Фармакодинамика

Ангиноваг объединяет в своем составе вещества противовоспалительного, анальгетического, антибактериального, антисептического и противовирусного действия. Объединение указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки ротовой полости. Препарат представлен в форме спрея с клапаном для распыления, благодаря чему удобен для применения при лечении инфекций ротоглотки.

Показания к применению

местное лечение при инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и верхних дыхательных путей: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты, глоссит.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 13 лет.

Перед применением прополоскать рот и глотку, удалить налет с пораженных участков. Ударная доза по 1-2 впрыскивания каждые 2-3 часа, поддерживающая – по 1 впрыскиванию каждые 6 часов. Курс лечения определяется врачом индивидуально, обычно составляет 5-7 суток.

Для правильного применения рекомендуется поместить флакон в вертикальном положении, чтобы пероральный аппликатор был направлен на зону поражения, но не полностью вводите в ротовую полость. Нажмите верхнюю часть колпачка сверху вниз. Не снимайте пероральный аппликатор с флакона после установки и применения.

Побочные действия

- аллергические реакции на компоненты препарата
- ощущение жжения, сухость
- легкое онемение.

Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата
- детский возраст до 13 лет.

Лекарственные взаимодействия

Не рекомендуется одновременное применение с новокаином, седативными препаратами.

Особые указания

Ангиноваг содержит 89,385 % этанола в конечном объеме. Каждое впрыскивание содержит приблизительно 0.075 г этанола, который может являться причиной риска применение в педиатрии до 13 лет, беременных женщин и пациентов с заболеваниями печени, алкоголизмом, эпилепсией, повреждениями головного мозга, поэтому применять с осторожностью.

Следует соблюдать осторожность при назначении больным с сахарным диабетом, так как препарат содержит сахаринат натрия.

Беременность и период лактации

Применение препарата в период беременности и лактации не противопоказано, но целесообразность приема устанавливает врач в зависимости от преимуществ пользы над потенциальным риском от применения. Не превышать рекомендованные дозы.

Особенности влияния на способность управлять автотранспортом или другими потенциально опасными механизмами

Учитывая содержания 0.075 г этанола необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или другими потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Форма выпуска и упаковка

По 20 мл препарата помещают во флаконы белого цвета из полиэтилена высокой плотности, укупоренные полипропиленовой крышкой.

По 1 флакону вместе с насадкой и инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

4 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Наименование и страна организации-производителя

Феррер Интернациональ С.А.,
Гран Виа де Карлос III, 94 08028 Барселона,
Испания.

Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения

Лаборатория Новаг С.А. Испания

Наименование и страна организации-упаковщика

Феррер Интернациональ С.А., Испания.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии потребителей по качеству продукции (товара)

Представительства «Медиал Ди энд Пи Лтд»
по Центральной Азии в РК
050050 г. Алматы, тел: +7 727 295 48 82/83,
факс 295 48 81.

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Медициналық және
фармацевтикалық қызметті
бақылау комитеті Төрағасының
2012 жылғы " 21 " 11
№ 896 бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

Дәрілік заттың медицинада қолданылуы жөніндегі нұсқаулық

Ангиноваг

Саудалық атауы

Ангиноваг

Халықаралық патенттелмеген атауы

Жоқ

Дәрілік түрі

Жергілікті қолдануға арналған спрей

Құрамы

100 мл препараттың құрамында
белсенді заттар:

деквалиний хлориді 0.1 г, тиротрицин 0.4 г,
β-глициррет қышқылы 0.06 г, гидрокортизон
ацетаты 0.06 г, лидокаин гидрохлориді 0.1 г,
қосымша заттар: пропиленгликоль, ананас
майы, натрий сахаринаты, этанол 96 %.

Сипаттамасы

Ананасқа тән дәмі мен иісі бар, мөлдір, түссіз
немесе ақшыл сары ерітінді.

Фармакотерапиялық тобы

Респираторлық жүйе ауруларын емдеуге
арналған препараттар. Тамақ ауруларын
емдеуге арналған препараттар.
ATX коды R02A.

Фармакологиялық қасиеттері

Фармакокинетикасы

Препарат ингаляциялық қолдануға арналған
және емдік концентрациясын негізінен қабыну
ошағында түзеді.

Фармакодинамикасы

Ангиноваг өзінің құрамында қабынуға қарсы,
аллергиялық, иммунитетті көтермелеуші,
антиоксиданттық, ауыруды басатын,
бактерияға қарсы және антисептикалық,
вирусқа қарсы әсер ететін заттарды біріктіреді.
Аталған фармакологиялық қасиеттердің бірігуі
жоғарғы тыныс жолдары мен ауыз қуысының
шырышты қабықтарының қабыну ауруларын
кешенді патогенетикалық емдеумен
қамтамасыз етеді. Препарат бүркуге арналған
клапаны бар спрей түрінде, соның арқасында
ауызжұтқыншақтың жұқпаларын емдеу үшін
қолдануға қолайлы.

Қолданылуы

- ауыз қуысы мен жоғарғы тыныс жолдарының
жұқпалы-қабынбалы аурулары: тонзиллитті,
фарингитті, ларингитті, афтоздық және ойық
жаралы стоматиттерді, глосситті жергілікті
емдеуде.

Қолдану тәсілі мен дозалары

Ересектер мен 13 жастан асқан балаларға.

Қолданар алдында ауыз бен жұтқыншақты
шайып, зақымдалған жерлердегі өңездерді
кетіру керек.

Екпінді дозасы - әр 2-3 сағат сайын 1-2 бүрку,
демеуші дозасы – әр 6 сағат сайын 1 бүркуден.

Емдеу курсын дәрігер жекелей анықтайды,
әдетте 5-7 тәулікті құрайды.

Дұрыс қолданылуы үшін, құтыны пероральді
аппликаторы зақымдалған аймаққа
бағыталатындай қылып тік қалыпта салу
ұсынылады, бірақ ауыз қуысына толық
енгізбеңіз. Қалпақшасының үстіңгі бөлігін
жоғарыдан төмен қарай басыңыз. Орнатқаннан
және қолданғаннан кейін құтынын пероральді
аппликаторын шешпеңіз.

Жағымсыз әсерлері

- препарат компоненттеріне аллергиялық реакциялар
- шымылдату сезімі, құрғау
- жеңіл үю.