

по медицинскому применению препарата

КЛИМАКСАН ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ

online-apteka.am

Регистрационный номер и дата: N 9838 от 20.08.2010 г.**Торговое название препарата:****КЛИМАКСАН ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ.****Лекарственная форма**

Таблетки гомеопатические.

Состав

Активные компоненты:

Cimicifuga racemosa, Cimicifuga (Цимицифуга рацемоза, Цимицифуга) C200; Lachesis mutus, Lachesis (Лахезис мутус, Лахезис) C50; Apis mellifica, Apis (Апис меллифика, Апис) C200.

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого или почти белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Показания к применению

В качестве симптоматического средства в терапии проявлений климактерического синдрома (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушения сна, головная боль, головокружение, сердцебиение, потливость, «приливы»).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

На один прием – 1 таблетку (держат в рту до полного растворения – не во время приема пищи), принимать 2 раза в день, утром и вечером.

В зависимости от тяжести симптомов возможно увеличение приема препарата до 3-4 раз в день.

Рекомендуемая длительность применения препарата составляет 6 месяцев. Возможно проведение повторных курсов лечения по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрированы.

Особые указания

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.

В период проведения курса лечения препаратом рекомендуется не реже 1 раза в 2 месяца консультироваться с лечащим врачом в целях возможной коррекции терапии.

Форма выпуска

Таблетки гомеопатические

По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 20, 30 или 50 таблеток в банку полимерную с винтовой горловиной и крышкой навинчиваемой для витаминов и лекарственных средств или банку полимерную с амортизатором и крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия для витаминов и лекарственных средств.

По 1 или 2 контурных ячейковых упаковки или каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»;

127473, Россия, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д.9

Тел./факс: (495) 684-43-33.

Գրանցման համարն ու ամսաթիվը N 9838, 20.08.2010.

Առևտրային անվանումը

ԿԼԻՄԱՔՍԱՆ ՀՈՄԵՈՊԱԹԱՅԻՆ

Դեղաձևը

Հոմեոպատային դեղահատեր

Բաղադրությունը

Ակտիվ նյութեր

Cimicifuga racemosa, Cimicifuga (մկանախոտ հուրանային, մկանախոտ) C200; Lachesis mutus, Lachesis (լախեզիս մուտուս, լախեզիս) C50; Apis mellifica, Apis (մեղրաբեր մեղու, ապիս) C200:

Օժանդակ նյութեր

Կաթնաշաքար, մանրաբյուրեղային ցելյուլոզ, մագնեզիումի ստեարատ:

Նկարագիրը

Մալխուսկ կամ գրեթե սպիտակ գույնի, հարթ զլանաձև, եզրահատածով դեղահատեր:

Դեղաբուժական խումբը

Հոմեոպատային դեղ

Կիրառման ցուցումները

Որպես ախտանշային բուժամիջոց՝ դաշտանադադարի համախտանիշի դրսևորումների (դրդվածություն, հոուզակա՝ անկայունություն, քնի խանգարում, գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխիռոց, քրտնոտություն, արյունահորդումներ) ժամանակ:

Հակացուցումները

Դեղի բաղադրամասերի նկատմամբ բարձրագույնություն

Կիրառման ձևն ու դեղաչափերը

Մեկ ընդունման համար՝ 1 դեղահատ (պահել բերանում մինչև լրիվ լուծվելը, ոչ՝ սնվելիս), ընդունել օրը 2 անգամ՝ առավոտյան ու երեկոյան:

Ախտանիշների ծանրությունից կախված՝ հնարավոր է դեղը կիրառել օրը 3-4 անգամ:

Կիրառման առաջարկվող տևողությունը 6 ամիս է: Բժշկի խորհրդով հնարավոր է կրկնել բուժման կուրսերը:

Կողմնակի ազդեցությունները

Հնարավոր են ալերգային ռեակցիաներ:

Գերդեղաչափումը

Պատահական գերդեղաչափման դեպքում հնարավոր են դեղի բաղադրության մեջ առկա լցանյութերով պայմանավորված մարսելախանգարի երևույթներ:

Փոխազդեցությունն այլ դեղերի հետ

Մինչ այժմ այլ դեղերի հետ անհամատեղելիության դեպքեր չեն գրանցվել:

Հատուկ հրահանգներ

Դեղի բաղադրության մեջ առկա է կաթնաշաքար, ուստի խորհուրդ չի տրվում նշանակել բնածին գալակտոզարյունությամբ, գլյուկոզի կամ գալակտոզի թերներծծման համախտանիշով հիվանդներին կամ բնածին կաթնաշաքարային անբավարարության դեպքում:

Բուժման կուրս իրականացնելիս՝ խորհուրդ է տրվում 2 ամիսը մեկ անգամից ոչ ուշ խորհրդակցել բուժող բժշկի հետ՝ բուժման հնարավոր շտկման նպատակով:

Թողարկման ձևը

20-ական դեղահատ՝ պոլիվինիլբլորիդային թաղանթից և ալյումինե փայլաթիթեղից ուրվագծված, խորշիկավոր փաթեթավորման մեջ:

20-, 30- կամ 50-ական դեղահատ՝ վիտամինների և դեղերի համար պտուտակավոր բկանցքով ու ներպտուտակվող կափարիչով պոլիմերային տարայում կամ վիտամինների և դեղերի համար մեղմիչով և առաջին բացման վերահսկմամբ ձգվող կափարիչով պոլիմերային տարայում:

1-ական կամ 2-ական խորշիկավոր փաթեթավորում կամ մեկ առանձին տարա կիրառման հրահանգի հետ մեկտեղ տեղադրում են կարտոնե տուփի մեջ:

Պահման պայմանները

Չոր, լույսից պաշտպանված, 25°C-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում:

Պահել երեխաներին անհասանելի տեղում:

Պիտանիության ժամկետը

3 տարի: Չկիրառել պիտանիության ժամկետը լրանալուց հետո:

Դեղատնային բացթողման կարգը

Առանց դեղատոմսի

Մպառոդների գանգատներն ընդունող արտադրող/վաճառկերպություն «Մատերիա Մեդիկա հոլդինգ ԳԱԸ» ՍՊԸ 127473, Ռուսաստան, ք.Մոսկվա, 3-րդ Սամոտեչնի նրբ, տ 9:

Հեռ/Ֆաքս (495) 684-43-33: