

Утверждено Министерством
здравоохранения Республики Беларусь
21 мая 2009 года

ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ

по медицинскому применению
лекарственного средства
(информация для пациентов)

Миконазол
(Miconazolum)

Торговое название: Миконазол.

Международное непатентованное название: Миконазол.

Лекарственная форма:

крем для наружного применения 2 %.

Состав: 15 г крема содержат действующее
вещество: миконазола нитрат – 300 мг;

вспомогательные вещества: пропиленгли-
коль, полиэтиленоксид 400, спирт цето-
стеариловый, проксанол-268, препарат

Описание: крем белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противогрибковое средство.

Код АТХ – D01AC02.

Показания к применению

Грибковые инфекции кожи и ногтевых пла-
стин, вызванные дерматофитами или
дрожжевыми грибами: Candida,
Trichophyton, Epidermophyton, Malassezia
furfur; смешанные грибковые или грибково-
бактериальные инфекции кожи; вторичное
инфицирование кожи грамположительными
микроорганизмами.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к миконазо-
лу, печеночная и/или почечная недостаточ-
ность. Детям до 3-х лет крем назначают
под контролем врача.

Способ применения

Крем слегка втирают в пораженные участки
кожи 2 раза в день, утром и вечером. При-
меняют до полного исчезновения симпто-
мов, и еще несколько дней с целью преду-
преждения рецидивов. В процессе терапии
проводят микологический контроль, резуль-
таты которого и определяют продолжи-
тельность лечения.

При лечении онихомикозов, после предва-
рительного отслоения поражённой ногтевой
пластины крем наносят тонким слоем на
ногтевое ложе 1 – 2 раза в день с после-

дующим наложением окклюзионной повяз-
ки. Лечение осуществляется непрерывно
до окончательного формирования новой
ногтевой пластины (не менее 3-х месяцев).

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится. В
редких случаях могут иметь место аллерги-
ческие кожные реакции и чувство жжения.

Особые указания

Если при лечении появляются реакции ги-
перчувствительности препарат необходимо
отменить. Нельзя допускать попадания
препарата в глаза. Крем при местном при-
менении не всасывается, и может исполь-
зоваться во время беременности и лакта-
ции.

При поражении ногтей следует обрезать их
как можно короче.

При поражении стоп тщательно обрабаты-
вать межпальцевые промежутки.

**Взаимодействие с другими лекарствен-
ными средствами**

Не рекомендуется применять одновремен-
но с другими мазями или кремами.

Упаковка

В тубах по 15 г.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при темпе-
ратуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Лекарственное средство не принимать по-
сле окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Название и адрес изготовителя

ОАО «Борисовский завод медицинских
препаратов», Республика Беларусь
Минская обл., г.Борисов, ул. Чапаева, 64/27,
тел/факс 732425.