

Amlo-Denk 10

Tablets – oral use
Calcium antagonist
Active substance: Amlodipine

Package leaflet: Information for the user

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you:

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

What is in this leaflet:

1. What Amlo-Denk 10 is and what it is used for
2. What you need to know before you take Amlo-Denk 10
3. How to take Amlo-Denk 10
4. Possible side effects
5. How to store Amlo-Denk 10
6. Contents of the pack and other information

1. What Amlo-Denk 10 is and what it is used for

Amlo-Denk 10 contains the active substance amlodipine and belongs to a group of medicines called calcium antagonists. Amlo-Denk 10 is used to treat high blood pressure (hypertension) or a certain type of chest pain called angina, a rare form of which is Prinzmetal's or variant angina. In patients with high blood pressure this medicine works by relaxing blood vessels, so that blood passes through them more easily. In patients with angina Amlo-Denk 10 works by improving blood supply to the heart muscle which then receives more ox-

ygen and as a result chest pain is prevented. This medicine does not provide immediate relief of chest pain from angina.

2. What you need to know before you take Amlo-Denk 10

Do not take Amlo-Denk 10

- if you are allergic to amlodipine or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6), or to any other calcium antagonists. This may be itching, reddening of the skin or difficulty in breathing.
- if you have severe low blood pressure (hypotension).
- if you have narrowing of the aortic heart valve (aortic stenosis) or cardiogenic shock (a condition where your heart is unable to supply enough blood to the body).
- if you suffer from heart failure after a heart attack.

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking Amlo-Denk 10.

You should inform your doctor if you have or have had any of the following conditions:

- Recent heart attack
- Heart failure
- Severe increase in blood pressure (Hypertensive crisis)
- Liver disease
- You are elderly and your dose needs to be increased

Children and adolescents

Amlodipine has not been studied in children under the age of 6 years. Amlodipine should only be used for hypertension in children and adolescents from 6 years to 17 years of age (see section 3).

For more information, talk to your doctor.

Other medicines and Amlo-Denk 10

Tell your doctor or pharmacist if you are taking/using, have recently taken/used or might take/use any other medicines.

Amlo-Denk 10 may affect or be affected by other medicines, such as:

- ketoconazole, itraconazole (anti-fungal medicines)
- ritonavir, indinavir, nelfinavir (so called protease inhibitors used to treat HIV)
- rifampicin, erythromycin, clarithromycin (antibiotics)
- hypericum perforatum (St. John's Wort)

• verapamil, diltiazem (heart medicines)

- dantrolene (infusion for severe body temperature abnormalities)
- tacrolimus (medicine used to alter the way your immune system works)
- simvastatin (used to reduce elevated cholesterol levels in the blood)
- cyclosporine (an immunosuppressant).

Amlo-Denk 10 may lower your blood pressure even more if you are already taking other medicines to treat your high blood pressure.

Amlo-Denk 10 with food and drink

Grapefruit juice and grapefruit should not be consumed by people who are taking Amlo-Denk 10. This is because grapefruit and grapefruit juice can lead to an increase in the blood levels of the active ingredient amlodipine, which can cause an unpredictable increase in the blood pressure lowering effect of Amlo-Denk 10.

Pregnancy and breast-feeding

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

Pregnancy

The safety of amlodipine in human pregnancy has not been established. If you think you might be pregnant, or are planning to get pregnant, you must tell your doctor before you take Amlo-Denk 10.

Breast-feeding

It is not known whether amlodipine is passed into breast milk. If you are breast-feeding or about to start breast-feeding you must tell your doctor before taking Amlo-Denk 10.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Driving and using machines

Amlo-Denk 10 may affect your ability to drive or use machines. If the tablets make you feel sick, dizzy or tired, or give you a headache, do not drive or use machines and contact your doctor immediately.

3. How to take Amlo-Denk 10

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

The usual initial dose is 5 mg amlodipine once daily. The dose can be increased to 10 mg amlodipine once daily.

This medicine can be used before or after food and drinks. You should take this medi-

cine at the same time each day with a drink of water. Do not take Amlo-Denk 10 with grapefruit juice.

Use in children and adolescents

For children and adolescents (6 – 17 years old), the recommended usual starting dose is 2.5 mg a day. The maximum recommended dose is 5 mg a day.

The 2.5 mg dose can not be obtained with Amlo-Denk 10 tablets as these tablets are not manufactured to break into four equal quarters.

It is important to keep taking the tablets. Do not wait until your tablets are finished before seeing your doctor.

If you take more Amlo-Denk 10 than you should

Taking too many tablets may cause your blood pressure to become low or even dangerously low. You may feel dizzy, light-headed, faint or weak. If blood pressure drop is severe enough shock can occur. Your skin could feel cool and clammy and you could lose consciousness. Seek immediate medical attention if you take too many Amlo-Denk 10 tablets.

If you forget to take Amlo-Denk 10

Do not worry. If you forget to take a tablet, leave out that dose completely. Take your next dose at the right time. Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you stop taking Amlo-Denk 10

Your doctor will advise you how long to take this medicine. Your condition may return if you stop using this medicine before you are advised.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Visit your doctor **immediately** if you experience any of the following side effects after taking this medicine.

- Sudden wheeziness, chest pain, shortness of breath or difficulty in breathing
- Swelling of eyelids, face or lips
- Swelling of the tongue and throat which causes great difficulty breathing
- Severe skin reactions including intense skin rash, hives, reddening of the skin over your whole body, severe itching,

blistering, peeling and swelling of the skin, inflammation of mucous membranes (Stevens Johnson Syndrome) or other allergic reactions

- Heart attack, abnormal heart beat
- Inflamed pancreas which may cause severe abdominal and back pain accompanied with feeling very unwell

The following **very common side-effects** have been reported. If any of these cause you problems or if they **last for more than one week**, you should **contact your doctor**.

Very common: affects more than 1 user in 10

- Ankle swelling (oedema)

The following **common side-effects** have been reported. If any of these cause you problems or if they **last for more than one week**, you should **contact your doctor**.

Common: affects 1 to 10 users in 100

- Headache, dizziness, sleepiness (especially at the beginning of treatment)
- Palpitations (awareness of your heart beat), flushing
- Abdominal pain, feeling sick (nausea)
- Altered bowel habits, diarrhoea, constipation, indigestion
- Tiredness, weakness
- Visual disturbances, double vision
- Muscle cramps

Other side-effects that have been reported include the following list. If any of these get serious, or if you notice any side-effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

Uncommon: affects 1 to 10 users in 1,000

- Mood changes, anxiety, depression, sleeplessness
- Trembling, taste abnormalities, fainting
- Numbness or tingling sensation in your limbs; loss of pain sensation
- Ringing in the ears
- Low blood pressure
- Sneezing/runny nose caused by inflammation of the lining of the nose (rhinitis)
- Cough
- Dry mouth, vomiting (being sick)
- Hair loss, increased sweating, itchy skin, red patches on skin, skin discolouration
- Disorder in passing urine, increased need to urinate at night, increased number of times of passing urine
- Inability to obtain an erection; discomfort or enlargement of the breasts in men

- Pain, feeling unwell
- Joint or muscle pain, back pain
- Weight increase or decrease

Rare: affects 1 to 10 users in 10,000

- Confusion

Very rare: affects less than 1 user in 10,000

- Decreased numbers of white blood cells, decrease in blood platelets which may result in unusual bruising or easy bleeding (red blood cell damage)
- Excess sugar in blood (hyperglycaemia)
- A disorder of the nerves which can cause weakness, tingling or numbness
- Swelling of the gums
- Abdominal bloating (gastritis)
- Abnormal liver function, inflammation of the liver (hepatitis), yellowing of the skin (jaundice), liver enzyme increase which may have an effect on some medical tests
- Increased muscle tension
- Inflammation of blood vessels, often with skin rash
- Sensitivity to light
- Disorders combining rigidity, tremor, and/or movement disorders

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store Amlo-Denk 10

- Keep this medicine out of the sight and reach of children.
- Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton and blister strip after "Exp". The expiry date refers to the last day of that month.
- Shelf life: 2 years
- Store in a dry place below 30 °C in the original packaging.
- Protect from light.
- Do not throw away any medicines via wastewater. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

6. Contents of the pack and other information

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Calcium channel blockers, selective calcium channel blockers with mainly vascular effects

ATC code: C08CA01
Amlodipine is a calcium ion influx inhibitor of the dihydropyridine group (slow channel blocker or calcium ion antagonist) and inhibits the transmembrane influx of calcium ions into cardiac and vascular smooth muscle. The mechanism of the antihypertensive action of amlodipine is due to a direct relaxant effect on vascular smooth muscle.

Pharmacokinetic properties

Absorption/Distribution/plasma protein binding

After oral administration of therapeutic doses, amlodipine is well absorbed with peak blood levels between 6–12 hours post dose. Absolute bioavailability has been estimated to be between 64 and 80 %. The volume of distribution is approximately 21 l/kg. In vitro studies have shown that approximately 97.5 % of circulating amlodipine is bound to plasma proteins.

The bioavailability of amlodipine is not affected by food intake.

Metabolism/Elimination

The terminal plasma elimination half-life is about 35–50 hours and is consistent with once daily dosing. Amlodipine is extensively metabolised by the liver to inactive metabolites with 10 % of the parent compound and 60 % of metabolites excreted in the urine.

What Amlo-Denk 10 contains

The active substance is amlodipine.

Each tablet contains 12.79 mg amlodipine mesilate 1H₂O, equivalent to 10 mg amlodipine.

The other ingredients are microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate anhydrous, sodium starch glycolate, magnesium stearate.

General classification for supply

Medicinal product subject to medical prescription

What Amlo-Denk 10 looks like and contents of the pack

Amlo-Denk 10 are white to off-white, round, biconvex tablets, scored on one side. The tablets can be divided into equal halves.

Amlo-Denk 10 is available in PVC/PE/PVDC-aluminium blisters. Pack size: 50 tablets.

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Denk Pharma GmbH & Co. KG
Prinzregentenstr. 79
81675 München
Germany

Production site

Göllstr. 1
84529 Tittmoning
Germany

Notice : information de l'utilisateur

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

online-apteka.am

Denk Pharma

Amlo-Denk 10

Comprimé – voie orale
Antagoniste calcique
Substance active : Amlodipine

Chez les patients présentant des valeurs élevées de la pression artérielle, ce médicament agit en relaxant les vaisseaux sanguins, de telle sorte que le sang les traverse plus facilement. Chez les patients atteints d'angor, Amlo-Denk 10 agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque, qui reçoit ainsi plus d'oxygène, ce qui prévient l'apparition d'une douleur thoracique. Ce médicament n'apporte pas de soulagement immédiat pour la douleur thoracique liée à l'angor.

Autres médicaments et Amlo-Denk 10

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé ou pourriez prendre/utiliser tout autre médicament.

Amlo-Denk 10 peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments, tel que :

- le kéroconazole, l'itraconazole (médicaments antifongiques)
- le ritonavir, l'indinavir, le nelfinavir (appelés inhibiteur de protéase utilisé pour traiter l'infection par le VIH)
- la rifampicine, l'érythromycine, la clarithromycine (antibiotiques)
- *Hypericum perforatum* (millepertuis)
- le vérapamil, le diltiazem (médicaments pour le cœur)
- le dantrolène (perfusion pour les augmentations sévères de la température corporelle)
- tacrolimus (médicament utilisé pour modifier le fonctionnement du système immunitaire)
- simvastatine (médicament utilisé pour abaisser des taux élevés de cholestérol dans le sang)
- cyclosporine (immunosuppresseur).

Amlo-Denk 10 peut diminuer votre pression artérielle encore davantage si vous prenez déjà d'autres médicaments destinés à traiter l'augmentation de la pression artérielle.

Amlo-Denk 10 avec des aliments et boissons

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Amlo-Denk 10. Vous devez informer votre médecin si vous présentez ou avez présenté l'une des conditions suivantes :

- crise cardiaque récente
- insuffisance cardiaque
- augmentation sévère de la pression artérielle (crise hypertensive)
- maladie du foie
- vous êtes une personne âgée et votre dose à besoin d'être augmentée

Enfants et adolescents

Amlo-Denk 10 n'a pas été étudié chez l'enfant âgé de moins de 6 ans. Amlo-Denk 10 ne doit être utilisé que pour le traitement de l'hypertension chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans (voir rubrique 3).

Pour des informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre médecin.

Allaitement

Il n'a pas été établi si l'amiodipine est excreté dans le lait maternel. Si vous allaitez ou si vous êtes sur le point d'allaiter, vous devez en parler à votre médecin avant de prendre Amlo-Denk 10.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Amlo-Denk 10 peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Si les comprimés provoquent des nausées, des vertiges ou une fatigue, ou encore des maux de tête, vous ne devez pas conduire des véhicules ni utiliser des machines, et vous devez contacter votre médecin immédiatement.

3. Comment prendre Amlo-Denk 10

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La posologie initiale habituelle d'amiodipine est de 5 mg une fois par jour. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 10 mg d'amiodipine une fois par jour.

Ce médicament peut être utilisé avant ou après la consommation d'aliments et de boissons. Il est préférable de prendre ce médicament à la même heure tous les jours avec un verre d'eau. Ne prenez pas Amlo-Denk 10 avec du jus de pamplemousse.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Pour les enfants et les adolescents (de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 2,5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour.

La dose de 2,5 mg ne peut pas être obtenue avec Amlo-Denk 10 comprimé car ces comprimés ne sont pas fabriqués pour être divisé en quatre parties égales.

Il est important de continuer à prendre les comprimés. N'attendez pas d'avoir pris tous vos comprimés avant de consulter votre médecin.

Si vous avez pris plus de Amlo-Denk 10 que vous n'auriez dû

Prendre trop de comprimés peut entraîner une baisse parfois dangereuse de votre pression artérielle. Vous pouvez ressentir des vertiges, des étourdissements, perdre

Information for Botswana
Scheduling status: S2
Registration number: BOT1101965
Date of publication: 11/2011

connaissance ou vous sentir faible. Si la pression artérielle diminue de manière trop sévère, un choc peut survenir. Votre peau peut devenir froide et moite et vous pouvez perdre conscience. Consultez un médecin si vous avez pris trop de comprimés d'Amlo-Denk 10.

Si vous oubliez de prendre Amlo-Denk 10

Ne vous inquiétez pas. Si vous avez oublié de prendre un comprimé, passez complètement la dose. Prenez la dose suivante selon le rythme normal. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Amlo-Denk 10

Votre médecin vous indiquera combien de temps vous devez prendre ce médicament. Votre maladie peut récidiver si vous arrêtez de prendre ce médicament avant que cela ne soit indiqué.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants après la prise de ce médicament.

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres
- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de grandes difficultés respiratoires
- Réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules, desquamation et gonflement de la peau, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson) ou autres réactions allergiques
- Crise cardiaque, battements cardiaques anormaux
- Inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale sévère accompagnée d'un très grand malaise

Les **effets indésirables très fréquents** suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou s'il **dure plus d'une semaine**, vous devez **contacter votre médecin**.

Effets indésirables très fréquents: peuvent affecter plus d'1 personne sur 10

- Gonflement (œdème) des chevilles

Les **effets indésirables fréquents** suivants ont été observés. Si l'un de ces effets devient gênant ou s'il **dure plus d'une semaine**, vous devez **contacter votre médecin**.

Effets indésirables fréquents: peuvent affecter 1 à 10 personnes sur 100

- Maux de tête, sensations vertigineuses, somnolence (en particulier au début du traitement)
- Palpitations (conscience de vos battements cardiaques), bouffées vasomotrices
- Douleur abdominale, nausées
- Perturbation du transit abdominal, diarrhée, constipation, indigestion
- Fatigué, faiblesse
- Troubles visuels, vision double
- Crampes musculaires

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante ont été rapportés. Si vous ressentez l'un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables peu fréquents: peuvent affecter 1 à 10 personnes sur 1 000

- Changement de l'humeur, anxiété, dépression, insomnie
- Tremblements, anomalies du goût, perte de conscience
- Sensations d'engourdissement ou de fourmillements dans les membres ; perte de la sensation de douleur
- Tintements dans les oreilles
- Diminution de la pression artérielle
- Éternuements et écoulement nasal provoqués par une inflammation de la muqueuse du nez (rhinite)

- Toux
- Bouche sèche, vomissements
- Perte de cheveux, augmentation de la transpiration, démangeaisons cutanées, plaques rouges sur la peau, changement de coloration de la peau
- Difficultés pour uriner, augmentation des envies d'uriner la nuit, augmentation du nombre de mictions

- Incapacité à obtenir une érection ; gêne ou augmentation des seins chez l'homme
- Douleur, malaise
- Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales
- Augmentation ou diminution du poids

Effets indésirables rares: peuvent affecter 1 à 10 personnes sur 10 000

- Confusion

Effets indésirables très rares: affectent moins d'un patient sur 10 000

- Diminution du nombre des globules blancs, diminution des plaquettes sanguines pouvant entraîner une formation anormale d'hématomes ou des saignements fréquents (lésions des globules rouges)
- Augmentation du sucre dans le sang (hyperglycémie)
- Trouble des nerfs entraînant une faiblesse, des fourmillements ou un engourdissement
- Gonflement des gencives
- Ballonnement abdominal (gastrite)
- Anomalies de la fonction hépatique, inflammation du foie (hépatite), jaunissement de la peau (ictère), élévation des enzymes hépatiques pouvant avoir un effet sur certaines analyses médicales

- Augmentation de la tension musculaire
- Inflammation des vaisseaux sanguins, souvent accompagnée d'une éruption cutanée
- Sensibilité à la lumière
- Troubles combinant de la rigidité, des tremblements et/ou trouble du mouvement

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Amlo-Denk 10

- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage et le blister après « Exp ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

- Durée de conservation : 2 ans
- Conserver dans un endroit sec au-dessous de 30 °C dans l'emballage original.
- Protéger de la lumière.
- Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Amlo-Denk 10

La substance active est amlodipine. Chaque comprimé contient 12,79 mg d'amlodipine mésilate 1 H₂O, soit 10 mg d'amlodipine. Les autres composants sont cellulose microcristalline, calcium hydrogénophosphate anhydre, carboxyméthylamidon sodique, magnésium stéarate.

Conditions de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale

Aspect d'Amlo-Denk 10 et contenu de l'emballage extérieur

Amlo-Denk 10 sont comprimés blanc à blanc cassé, ronds, biconvexes avec une barre de sécabilité d'un côté. Les comprimés peuvent être divisés en deux moitiés égales.

Amlo-Denk 10 est disponible sous forme de plaquettes thermoformées en PVC/PE/PPVC/aluminium.

Présentation : boîte de 50 comprimés

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché et Fabricant

DENK PHARMA GmbH & Co. KG
Prinzregentenstr. 79
81675 München
Allemagne

Site de production

Göllstr. 1
84529 Tittmoning
Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 03/2016.



que passar mais facilmente. Em doentes com angina, Amlo-Denk 10 atua por aumento do fornecimento de sangue ao músculo do coração que recebe mais oxigénio e como resultado previne a dor do peito. Este medicamento não proporciona um alívio imediato da dor no peito devido a angina.

2. O que precisa de saber antes de tomar Amlo-Denk 10

Não tome Amlo-Denk 10

- se tem alergia à amlodipina, ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6), ou a qualquer outro antagonista de cálcio. Os sintomas podem incluir comichão, vermelhidão da pele ou dificuldade em respirar.
- se tem pressão arterial baixa grave (hipotensão).
- se tem estreitamento da válvula aórtica (estenose aórtica), choque cardiogênico (condição clínica onde o seu coração é incapaz de fornecer sangue suficiente ao resto do corpo).
- se sofre de insuficiência cardíaca resultante de um ataque cardíaco.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Amlo-Denk 10.

Deve informar o seu médico se tem ou teve algumas das seguintes situações:

- Ataque cardíaco recente
- Insuficiência cardíaca
- Aumento grave da pressão arterial (crise hipertensiva)
- Doença do fígado
- Se é idoso e a sua dose necessita de ser aumentada

Crianças e adolescentes

Amlo-Denk 10 não foi estudado em crianças com idade inferior a 6 anos. Amlo-Denk 10 apenas deve ser utilizado em crianças e adolescentes entre os 6 e os 17 anos de idade (ver secção 3).

Para mais informações fale com o seu médico.

Outros medicamentos e Amlo-Denk 10

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.

Amlo-Denk 10 pode afetar ou ser afetado por outros medicamentos, tais como:

- cetoconazol e itraconazol (medicamentos antifúngicos)

• ritonavir, indinavir, nelfinavir (também designados de inibidores da protease utilizados no tratamento do VIH)

• rifampicina, eritromicina, claritromicina (antibióticos)

• hiperíaco (Erva de São João)

• verapamilo, diltiazem (medicamentos para o coração)

• dantroleno (perfusão para alterações graves da temperatura corporal)

• tacrolimus (medicamento utilizado para alterar a forma como o sistema imunitário funciona)

• simvastatina (um medicamento para diminuir os níveis de colesterol)

• ciclosporina (um imunossupressor)

Amlo-Denk 10 pode baixar ainda mais a sua pressão arterial, se já estiver a tomar outros medicamentos para tratar a pressão arterial elevada.

Amlo-Denk 10 com alimentos e bebidas

Pessoas que estejam a tomar Amlo-Denk 10 não devem consumir sumo de toranja e toranja. A toranja e o sumo de toranja podem levar a um aumento dos níveis de amiodipina no sangue, o que pode causar um efeito imprevisível de diminuição da pressão arterial provocada por Amlo-Denk 10.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Gravidez

A segurança da amiodipina na gravidez não foi estabelecida. Se pensa que pode estar grávida ou planeia engravidar, fale com o seu médico antes de tomar Amlo-Denk 10.

Aleitamento

Não é conhecido se a amiodipina é excretada para o leite materno. Se está a amamentar ou vai iniciar a amamentação, fale com o seu médico antes de tomar Amlo-Denk 10.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Amlo-Denk 10 pode afetar a sua capacidade para conduzir ou utilizar máquinas. Se os comprimidos o fazem sentir doente, com tonturas ou cansado, ou fazem dor de cabeça, não conduza nem utilize máquinas e fale com o seu médico imediatamente.

3. Como tomar Amlo-Denk 10

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose inicial recomendada é de 5 mg de amiodipina uma vez por dia. A dose pode ser aumentada para 10 mg uma vez por dia. Este medicamento pode ser tomado antes ou depois de alimentos e bebidas. Deve tomar o medicamento à mesma hora, todos os dias, com um copo de água. Não tome Amlo-Denk 10 com sumo de toranja.

Utilização em crianças e adolescentes

Em crianças e adolescentes (dos 6 aos 17 anos de idade), a dose inicial recomendada é de 2,5 mg por dia. A dose máxima recomendada é de 5 mg por dia.

A dose de 2,5 mg não pode ser obtida com Amlo-Denk 10 mg uma vez que estes comprimidos não são produzidos para serem partidos em quatro partes iguais.

É importante que tome sempre os comprimidos. Não espere até os seus comprimidos acabarem para falar com o seu médico.

Se tomar mais Amlo-Denk 10 do que deveria

Tomar demasiados comprimidos de Amlo-Denk 10 pode provocar uma descida da pressão arterial até níveis perigosamente baixos. Pode-se sentir tonto, confuso, cansado ou fraco. Se a diminuição da sua pressão arterial for grave, pode entrar em choque. A sua pele pode ficar fria e húmida e pode perder a consciência. Procure apoio médico imediato se tomou demasiados comprimidos de Amlo-Denk 10.

Caso se tenha esquecido de tomar Amlo-Denk 10
Não se preocupe. Se se esqueceu de tomar um comprimido, esqueça essa dose. Tome a próxima dose à hora correta. Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Amlo-Denk 10

O seu médico irá dizer-lhe o tempo que deverá tomar este medicamento.

A sua situação pode piorar se parar de tomar este medicamento antes do tempo aconselhado.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Consulte o seu médico **imediatamente** se sentir alguns dos seguintes efeitos secundários depois de tomar este medicamento.

- Dificuldade respiratória súbita, dor no peito, falta de ar ou dificuldade em respirar
- Inchaço das pálpebras, face ou lábios
- Inchaço da língua e garganta, que pode provocar grandes dificuldades para respirar

• Reações na pele graves, incluindo erupção na pele intensa, urticária, vermelhidão da pele ao longo de todo o seu corpo, comichão intensa, bolhas, descamação e inchaço da pele, inflamação das membranas mucosas (Síndrome de Stevens-Johnson) ou outras reações alérgicas

- Ataque cardíaco, batimentos cardíacos alterados
- Inflamação do pâncreas que pode causar dor grave abdominal e nas costas acompanhada de sensação de mal-estar.

Foram comunicados os seguintes **efeitos secundários muito frequentes**. Se algum destes efeitos lhe provocar problemas ou **durar mais de uma semana**, deverá falar com o seu médico.

Muito frequentes: afetam mais de 1 em 10 pessoas

- Inchaço dos tornozelos (edema)

Foram comunicados os seguintes **efeitos secundários frequentes**. Se algum destes efeitos lhe provocar problemas ou **durar mais de uma semana**, deverá falar com o seu médico.

Frequentes: afetam 1 a 10 pessoas em 100

- Dor de cabeça, tonturas, sonolência (especialmente no início do tratamento)
- Palpitações (consciência do seu batimento cardíaco), rubor
- Dor abdominal, sensação de mal-estar (náuseas)
- Alteração dos hábitos intestinais, diarreia, prisão de ventre, indigestão
- Cansaço, fraqueza
- Distúrbios da visão, visão dupla
- Câibras musculares

Outros efeitos secundários comunicados, estão incluídos na lista seguinte. Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não

mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Pouco frequentes: afetam 1 a 10 pessoas em 1000

- Alterações do humor, ansiedade, depressão, insónias

• Tremores, alterações do paladar, desmaio

- Sensação de formigueiro ou adormecimento nos membros, diminuição da sensação de dor

- Zumbidos

- Pressão arterial baixa

• Espirros/corrimento nasal provocado por uma inflamação no revestimento da nariz (rinite)

- Tosse

- Boca seca, vômitos (mal estar)

• Queda de cabelo, aumento da transpiração, comichão na pele, manchas vermelhas na pele, alteração da cor da pele

- Problemas em urinar, aumento da necessidade de urinar à noite, aumento do número de vezes que urina

• Incapacidade de obter uma ereção, desconfortos ou aumento das mamas nos homens

- Dor, má disposição

• Dor nos músculos ou articulações, dor de costas

- Aumento ou diminuição de peso

Raros: afetam 1 a 10 pessoas em 10 000

- Confusão

Muito raros: afetam menos de 1 pessoa em 10 000

• Diminuição do número de células brancas do sangue, diminuição do número de plaquetas no sangue o que pode resultar num aumento pouco comum de nódulos negras ou hemorragias (lesões nas células vermelhas do sangue)

- Excesso de açúcar no sangue (hiperglicemia)

• Alteração das terminações nervosas que pode provocar fraqueza, formigueiro e dormência

- Inchaço das gengivas

• Inchaço abdominal (gástrite)

• Alteração da função hepática, inflamação do fígado (hepatite), amarelecimento da pele (ictericia), aumento das enzimas do fígado que poderão ter efeito sobre alguns exames médicos

- Aumento da tensão muscular

• Inflamação dos vasos sanguíneos, geralmente com erupções na pele

- Sensibilidade à luz

• Disfunções que combinam rigidez, tremor e/ou alterações no movimento

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar Amlo-Denk 10

• Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

• Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no blister após "Exp". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

• Prazo de validade: 2 anos.

• Conservar num local seco abaixo de 30 °C na embalagem original.

• Proteja da luz.

• Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Amlo-Denk 10

A substância ativa é a amiodipina.

Cada comprimido contém 12,79 mg de monohidrato mesilato de amiodipina, equivalente a 10 mg de amiodipina.

Os outros componentes são: celulose microcristalina, hidrogenofosfato de cálcio anidro, amido glicolato de sódio, estearato de magnésio.

Classificação quanto à dispensação pública

Medicamento sujeito a receita médica.

Qual o aspeto de Amlo-Denk 10 e conteúdo da embalagem

Amlo-Denk 10 são comprimidos de cor branca a esbranquiçada, redondos, biconvexos e ranhurados num dos lados. Os comprimidos podem ser divididos em metades iguais.

Amlo-Denk 10 está disponível em blisters de PVC/PE/PVDC-alumínio.

Tamanho da embalagem: 50 comprimidos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

DENK PHARMA GmbH & Co. KG

Prinzregentenstr. 79
81675 München

Alemanha

Linha de produção

Göllstr. 1
84529 Tittmoning

Alemanha

Última revisão do folheto em 03/2016.

Vers. 5119/10.2015
Mat.-Nr. 40106295