

ДЕНТОКИНД

Таблетки

Листок-вкладыш. Информация для пациентов.

Внимательно прочитайте листок-вкладыш, прежде чем начать принимать данное лекарственное средство!

Сохраните листок-вкладыш, может быть Вам понадобится прочитать его еще раз.

Более подробную информацию Вы сможете получить у Вашего врача или фармацевта. Если сочтете необходимым, обратитесь к ним за советом.

Состав

В 1 таблетке (100 мг) содержится:

активные вещества: Belladonna trit. D6 15 мг, Chamomilla trit. D6 15 мг, Ferrum phosphoricum trit. D6 15 мг, Hepar sulfuris trit. D12 15 мг, Pulsatilla trit. D6 15 мг;

прочие ингредиенты (наполнители): микрокристаллическая целлюлоза, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое лекарственное средство.

Показания

Болезненные явления при прорезывании зубов у детей грудного и младшего возраста, включая раздражительность, беспокойство, оталгию (боль в ушах), болезненность десен, лихорадку и диарею.

Противопоказания

ДЕНТОКИНД не следует применять, если у Вашего ребёнка аллергия (гиперчувствительность) к одному из активных или вспомогательных ингредиентов этого препарата.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Пожалуйста, информируйте Вашего врача или фармацевта, если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства. Это касается также медикаментов, которые можно приобрести без рецепта.

Особые предостережения и меры предосторожности

Если Вы заметите, что Ваш ребёнок недостаточно отвечает на ДЕНТОКИНД, или у него появляются непредвиденные симптомы, обратитесь, пожалуйста, к врачу.

Режим дозирования и способ применения

Всегда применяйте ДЕНТОКИНД так, как Вам сказал Ваш врач или фармацевт. Если Вы не уверены в чём либо, посоветуйтесь с Вашим врачом или фармацевтом. Обычно препарат применяют так, как это описано ниже.

Дети до 1 года

При острых симптомах по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 таблеток в день.

После ослабления симптоматики по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети от 1 года до 6 лет

При острых симптомах по 2 таблетки через каждый час, но не более 12 таблеток в день.

После ослабления симптоматики по 2 таблетки 3 раза в день.

Таблетки предпочтительно принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. При лечении грудных детей таблетки можно растворять в небольшом количестве воды.

Опасность развития вредных эффектов при передозировке отсутствует.

Побочные действия

Как и все прочие лекарственные средства ДЕНТОКИНД может вызывать побочные явления, но развиваются они не у каждого.

У препарата ДЕНТОКИНД нет известных побочных действий.

Если Вы заподозрите, что после приема препарата ДЕНТОКИНД у Вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта, информируйте об этом Вашего врача или фармацевта.

Примечание. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение); в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

5 лет.

Не применяйте ДЕНТОКИНД после даты истечения срока годности, указанной на картонной коробке и на флаконе.

Хранение

Хранение данного лекарственного средства не требует особых условий. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и её содержимое

Стеклянные флаконы по 150 таблеток, упакованные в картонные коробки.

Категория отпуска

Отпускается без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион,

ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ,

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия,

тел. +49 (721) 4093 236