

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

КЛОТРИМАЗОЛ

суппозитории вагинальные 100 мг

Международное непатентованное название (МНН) –

Клотримазол

Состав лекарственной формы

Один суппозиторий содержит:

Активное вещество: клотримазол 100 мг;

Вспомогательные вещества: твердый жир.

Форма выпуска: суппозитории вагинальные по 100 мг, цилиндроконической формы, белого или белого с желтоватым оттенком цвета. На срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня, и воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептик и противомикробный препарат для лечения гинекологических заболеваний. Производные имидазола. **Код АТХ:** G01AF02.

Фармакологические свойства

Клотримазол – противогрибковое средство широкого спектра действия, производное имидазола. Оказывает противогрибковое, антибактериальное и трихомонацидное действие.

Фармакодинамика. Механизм действия связан с нарушением синтеза эргостерола, являющегося составной частью клеточной мембраны грибов, изменением проницаемости мембраны гриба и лизисом клетки.

Активен в отношении дерматофитов, плесневых и дрожжеподобных грибов (рода *Candida*), *Malassezia furfur*; *Corynebacterium* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp.; *Bacteroides* spp., *Gardnerella vaginalis*; *Trichomonas vaginalis*.

Фармакокинетика. Клотримазол в небольшой степени абсорбируется со слизистых оболочек и практически не оказывает системного действия. При интравагинальном введении абсорбируется 3–10 % введенной дозы. Высокие концентрации в вагинальном секрете и низкие концентрации в крови сохраняются в течение 48–72 ч. В печени быстро биотрансформируется до неактивных метаболитов и выводится с фекалиями.

Показания

Генитальные инфекции, вызванные дерматофитами, плесневыми и дрожжеподобными грибами и/или *Trichomonas vaginalis*; вагинальные бактериальные суперинфекции, вызванные чувствительными к клотримазолу микроорганизмами; санация родовых путей перед родами; профилактика гинекологических инфекций до и после хирургических манипуляций.

Противопоказания

Гиперчувствительность к клотримазолу, I триместр беременности.

С осторожностью назначают препарат в период лактации. Назначение препарата во II и III триместрах беременности решается индивидуально (когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца).

Особенности применения

Для предотвращения реинфекции необходимо проводить одновременное лечение половых партнеров. При трихомониазе рекомендуется сочетанный прием с системными химиотерапевтическими средствами (метронидазол внутрь). Появление выраженных местных реакций (раздражения)

или признаков гиперчувствительности требует прекращения лечения. При отсутствии клинического улучшения в течение 4-х недель необходимо провести микробиологическое исследование для уточнения диагноза. Не рекомендуется применять препарат в период менструации. При наличии одновременной инфекции наружных гениталий (половые губы, вульва) интравагинальное применение суппозитория рекомендуется сочетать с местным наружным применением клотримазола в виде крема. У больных с печеночной недостаточностью следует периодически проверять функциональное состояние печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении Клотримазол снижает эффективность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков. Активность Клотримазола снижается при одновременном применении с нистатином.

Беременность и лактация

Не рекомендуют применение клотримазола в I триместре беременности. Вопрос о целесообразности назначения препарата во II и III триместрах беременности должен решаться индивидуально. На время лечения прекращают кормление грудью.

Влияние на способность к вождению и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами.

Способ применения и дозы

Интравагинально. По одному суппозиторию 1 раз в сутки перед сном в течение 6 дней. При необходимости курс лечения повторяют после консультации врача. Для санации родовых путей рекомендуется однократное применение одного суппозитория.

Передозировка

В связи с низкой абсорбцией препарата передозировка при интравагинальном применении маловероятна. Местное применение препарата в дозах, превышающих рекомендуемую дозировку не вызывает опасных для жизни реакций.

Побочные действия и реакции

Гиперемия и отек слизистой оболочки, выделения из влагалища, зуд, жжение.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Отпускать без рецепта.

Упаковка

По 6 суппозитория в контурной ячейковой упаковке. По 1 контурной ячейковой упаковке № 6 вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Производитель

ООО "ФАРМАПРИМ"

ул. Криулень, 5, с. Порумбень, р-он Криулень,

Республика Молдова, MD-4829

www.farmaprim.md