

online-apteka.am Г Е Р А Л (ОРНИДАЗОЛ)

Международное непатентованное название: орнидазол.

Фармакотерапевтическая группа: Противопроtoзойный препарат с антибактериальной активностью.

Код АТХ - J01XD03.

СОСТАВ

Одна таблетка покрытая оболочкой препарата содержит 500 мг активного вещества – орнидазола.

Вспомогательные вещества: микрокристаллическая целлюлоза, лактоза, натрия лаурилсульфат, поливинилпирролидон, кроскармеллоза натрия, натрия крахмала гликолят, LS-гидроксипропилцеллюлоза, магния стеарат, порошок для оболочки «Opadry II Green».

ДЕЙСТВИЕ

Противопроtoзойный препарат с антибактериальной активностью. Орнидазол взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий.

Орнидазол активен в отношении: *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica*; облигатных анаэробных микроорганизмов: *Bacteroides* spp. (в т.ч. *Bacteroides fragilis*, *Bacteroides distasonis*, *Bacteroides ovatus*, *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Bacteroides vulgatus*), *Fusobacterium* spp., *Veillonella* spp., *Prevotella* spp. (*Prevotella bivia*, *Prevotella buccae*, *Prevotella disiens*); грамположительных микроорганизмов: *Eubacterium* spp., *Clostridium* spp.

К препарату не чувствительны аэробные микроорганизмы.

Орнидазол хорошо всасывается из ЖКТ. Время достижения C_{max} - 1-3 ч. Связывание с белками плазмы - не менее 15%. Проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени и в виде метаболитов выводится с мочой (60-70%) и калом (20-25%). Около 5% выводится неизмененном виде. $T_{1/2}$ составляет 13 ч.

ПОКАЗАНИЯ

- трихомониаз;
- амебиаз, амебная дизентерия, внекишечный амебиаз (в т.ч. амебный абсцесс печени);
- лямблиоз;
- профилактика инфекций, вызванных анаэробными бактериями, при операциях на ободочной кишке и в гинекологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- органические заболевания ЦНС;
- I триместр беременности и период лактации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следует соблюдать осторожность у пациентов с заболеваниями ЦНС, например, с эпилепсией, поражениями головного мозга, рассеянным склерозом.

При превышении рекомендуемых доз имеется определенный риск у больных с поражением печени, злоупотребляющих алкоголем, беременных и кормящих матерей и детей.

При лечении трихомониаза следует обязательно лечить половых партнеров.

После лечения лямблиоза, если симптомы сохраняются, через 3 – 4 недели необходимо провести 3 анализа кала с интервалами в несколько дней (у некоторых успешно пролеченных больных непереносимость лактозы, вызванная инвазией, может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев, напоминая симптомы лямблиоза).

Больным сахарным диабетом, принимающим сахароснижающие препараты, назначать орнидазол следует с осторожностью.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

С учетом возможного развития побочных эффектов со стороны нервной системы (в т.ч. головокружение, нарушение координации движений) в период лечения препаратом следует воздержаться от управления транспортными средствами и от занятий другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Беременность и лактация

Препарат противопоказан к применению в I триместре беременности и в период лактации.

Передозировка

Симптомы: эпилептиформные судороги, депрессия, периферический неврит.

Лечение: проводят симптоматическую терапию. При судорогах - диазепам.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В отличие от других производных нитроимидазола, орнидазол не ингибирует альдегиддегидрогеназу и не является поэтому несовместимым с алкоголем.

Однако орнидазол потенцирует действие пероральных антикоагулянтов кумаринового ряда, что требует соответствующей коррекции их дозы.

Орнидазол удлиняет миорелаксирующее действие векурония бромида.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Герал принимают внутрь после еды.

При *трихомониазе* взрослым назначают по 0.5 г (1 таблетка) 2 раза/сут в течение 5 дней. Чтобы устранить возможность повторного заражения, половой партнер во всех случаях должен получить такой же курс лечения.

Детям дозу устанавливают из расчета 25 мг/кг массы тела 1 раз/сут однократно.

При *амебной дизентерии* взрослым и детям с массой тела более 35 кг назначают по 1.5 г (3 таблетки) 1 раз/сут, с массой тела более 60 кг - 2 г/сут (4 таблетки), по 2 таблетки утром и вечером. Детям с массой тела менее 35 кг суточную дозу устанавливают из расчета 40 мг/кг массы тела. Курс лечения - 3 дня.

При *других формах амебиаза* взрослым и детям с массой тела более 35 кг - по 500 мг (1 таблетка) 2 раза/сут, детям с массой тела до 35 кг - 25 мг/кг однократно в течение 5-10 дней.

При *лямблиозе* взрослым и детям с массой тела более 35 кг - по 1.5 г (3 таблетки) однократно вечером, детям с массой тела менее 35 кг - по 40 мг/кг один раз в сутки. Продолжительность терапии составляет 1-2 дня.

Для *профилактики инфекций, вызванных анаэробными бактериями*, назначают по 0.5-1 г (1-2 таб.) перед операцией и по 0.5 г (1 таб.) 2 раза/сут после операции в течение 3-5 дней.

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, сонливость, головокружение, тремор, ригидность, дискоординация движений, судороги, усталость, нарушение сознания, сенсорная или смешанная периферическая невропатия.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, извращения вкусовых ощущений, рвота, изменения печеночных функциональных проб.

Со стороны кроветворной системы: лейкопения, нейтропения;

Иммунная система: проявления кожных реакций и реакций гиперчувствительности.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре 15-25°C.

Срок годности - 3 года. Препарат нельзя использовать после истечения срока годности.

ФОРМА ВЫПУСКА

Таблетки, покрытые оболочкой по 500 мг, по 10 таблеток в блистере, в картонной упаковке 1 блистер вместе с инструкцией по применению.

НАЗНАЧЕНИЕ

По рецепту врача!